Herbarium
QK
369
.I36
1874
v.9

UNIVERSITY OF WYOMING
U18100 424 828 6
Herbarium
QK
369
.I 36
1874
v. 9

[redacted]

Date Due

Demco 293-5

草木圖說前篇卷九

(43) KOKINBAI.
WALDSTEINIA SIBIRICA TRATT.
(ROSACEAE.)

草之九 〇十二圖五回 二四十六 平木生寫

コキンバイ

三葉一柄上ニ聚テ一葉ヲナシ。毎葉大缺刻鋸歯アリ。葉剛フ
初葉ハ殆ドミツバゼリノ如ク。心葉ハ缺刻差ヤ深シ。多葉一窠ニ簇生シ。冬ニ至テ
不枯シテ微ク紫色ヲ帯ブ。葉下幹ノ如ク根ノ如ク木様地上ニ立ツ一二寸。春新
葉ト共ニ数花茎ヲ生スルコト五六寸。二三枝分シ三五ノ細小葉ヲツケ。毎頭一花。
大小十葉。委陵菜（カハラサイコ）蛇苺（ヘビイチゴ）等ノ類ノ如ク。花五瓣圓メ深黄色。大ニ
纖鋭ノ多柱併接メ柯子状ヲナシ。多雄蕊蕚ニツヒテ黄葯。憩ニ
花下同類ノ如クナレ𪜈。生殖部ニ在ツテハ其態ヲ異ニス𪜈

〔薔薇科〕

所見属未考

(42) MIYAMA-DAIKONSŌ.
GEUM ROTUNDIFOLIUM.
(ROSACEAE.)

卷之九 ○十三綱五目 四十五 平林全哉

(四二) ミヤマダイコンサウ

白山立山等ノ嶺上ニ生ス。草常種ヨリ小柄頭扁圓ニメ鋸齒アル一大葉ソノ本ニ鰭様ノ小葉ニ三アツテ。常種ノ犬小葉相間スルト不同。莖葉ノ形色ハ常種ト同ジケレ共辨稍大ニメ。質厚ク光澤アツテ毛茸ナク。莖葉ノ形色ハ常種ト同ジケレ共辨稍大ニメ。柱未織細ニメ鉤頭ナラズ試之ニ根氣味常種ニ劣ル」

〔薔薇科〕

DAIKONSŌ.
GEUM JAPONICUM TH.
(ROSACEAE.)

明治廿四年五月十日　平木金蔵

（四一）ダイコンサウ　水楊梅

山林陰地ニ多ク生ノ宿根シ。々葉略ボ羅蔔（ダイコン）葉ノ如ク。大小相間シテ互生ン。梢ニ至ツテ漸小ニメ鋸齒様ヲナサズ。莖葉柄ヲ抽ㇾ二尺餘數、葉ヲ互生本必ス卵圓尖裂アルニ托葉アリ。莖頂分枝毎頭一花ヲ開ク。萼大小十片ソノ五者大ニメ形半披針狀ニメ齲下シ。小者ハ各〻大者ニ間シテ齲セズ。花五瓣圓メ黄色形梅花ノ如メ稍小。中心實礎苗様。頭延テ柱ヲナシ未曲ツテ頭ㇾ底多クノ長白毛アルㇾ殆ト薊類ノ冠毛ノ如シ。多雄蕊圖之莖葯共ニ深黄色。實メ毛球狀ヲナス一種白花ノ品又細葉ノ品等アリ。主用菜鏡載之」　附實礎并柱部大圖

（ゲウム）第二種　ゲウム　ルバスクム　Geum rivale. Linn.　羅

挾林氏所說形狀的當ス。然ルニ春氏ノ第二種者我大根サウノ名ヲ施セバ。林氏令試之ニ氣味功用全ク同シケレバ余ハ同種ト斷ス。

ナーゲルウヲルトルベル　Geum rivale. Linn.　ゲユム　ヤポニクム　Geum japonicum.

ノ名ヲ下シ。西勃氏ニ些異アルニヨルカ。

(40) TSURUKINBAI.

POTENTILLA FRAGIFORMIS WIGHT. VAR. GELIDA TRATT.

(ROSACEAE.)

十三巻 第十号 植物学雑誌

（四十）ツルキンバイ　小葉ツチグリ一種

山中山崖所在コレアリ。草小ニメ窠（カブ）ヲナシテ簇生シ。葉小葉蛇苺ノ如ク三葉一帯ニメ鋸歯鋭リ。地ニヨリテ葉尖鈍ニメコキンバイノ如モアリ茎葉背共ニ微毛アリ。春簇葉間茎ヲ抽キ高三四寸。茎ニ一二葉並ニ小托オヘビイチゴノ花ノ如ク萼共ニ熱實ノ形亦同シ。根際茎ヲ出シ苗ヲ分テドモ。キヂムシロノ長ク線ヲ引ガ如クナラズシテ。蛇苺トキヂムシロノ中間ニ立ツモノヽ如シ。根ハ結塊小指ノ如クメ小。外皮黒褐ヨツテ草狀些異アリ。木曽産ハ鋸歯尤尖鋭。又茲野産ハ。茎ツチグリノ下ニ枝ム。此種産地ニツクルコト多ク。叢簇一窠ヲナシテ殆ト特生草ノ如クナレドモ。後絶ニ蔓様ニノビテ苗ヲ分ツノコトアルニ至テハ。ソノ態ヲ同シフス

〔薔薇科〕

(39) KIJIMUSHIRO.

POTENTILLA FRAGARIOIDES L. VAR. STOLONIFERA LEHM.

(ROSACEAE)

明治十二年十二月廿三日出版　小木定成

（卅九）キジムシロ

草狀ツチグリニ似テ小。莖葉彼ノ如ク剛カラズノ微毛アリ。大低五七ノ小葉ヲ以テ一鞘ヲ結ブヲナシ。春簇葉間莖ヲ抽ク數寸。三葉一蒂ノ細葉ニシテグリニ似テ小。莖葉彼ノ如ク剛カラズノ微毛アリ。大低五七ノ小葉ヲ以テ一鞘ヲ結ブヲナシ。春簇葉間莖ヲ抽ク數寸。三葉一蒂ノ細葉ニシテグリニ似テ小。莖葉彼ノ如ク剛カラズノ微毛アリ。大低五七ノ小葉ヲ以テ一鞘ヲ結ブヲナシ。春簇葉間莖ヲ抽ク數寸。三葉一蒂ノ細葉ニシテグリニ似テ小。莖葉彼ノ如ク剛カラズノ微毛アリ。大低五七ノ小葉ヲ以テ一鞘ヲ結ブヲナシ。春簇葉間莖ヲ抽ク數寸。三葉一蒂ノ細葉ニシテ

〔薔薇科〕



MITSUBA-TSUCHIGURI.
POTENTILLA FRAGIFORMIS WIGHT.
(ROSACEAE.)

(卅九)ミツバツチグリ　　薔薇白草

近道山野ニ尤多ク。一柄尺許三葉一蒂形蛇莓葉ニ似テ大。又ク稍長大ニメ剛ク。冬ヲ経テ凋マズ。春花實アリ。形上条ト同シ。ホ葉背ニ毛有無ノ二種アリ。根ハ初メ珠堰後稍長メ七八分ニ至ル。味前条種ト同シ



ŌBA-TSUCHIGURI.
POTENTILLA.
(ROSACEAE.)



（卅七）オホバツチグリ　或云大葉カハラサイコ

向陽ノ山中ニ多ク。略前種ニ同ノ葉稍大ニ楕圓ニメノ粗鋸齒アル七葉ヲ以テ一簇ヲナシ。全葉ノ長サ尺ニ過ク。質厚強ニメ微毛アルト又殆ト毛ナキガ如キトアリ。花實根形別ニ異ナク。只ツノ大葉ナルノ不同ヲ見ルノミ

〔薔薇科〕

(36) TSUCHIGURI. B.
POTENTILLA FRAGARIOIDES L.
(ROSACEAE.)

三十九 平本紀載

(卅六)ツチグリ一種ロ

草形上条種ニ似レ𪜈稍大ニ。葉卵圓ニメ尖リ鋸齒アル七或ハ九小葉ヲ以テ一鰭ヲナス。早春呼出ノ葉ハ。小ニメ小鰭ノ數多ク。夏至テ出ル処ハ。大ニメ小鰭ノ數多ハ七ツノ小鰭ノ如キモノアリ。共ニ花莟茎ニ纖細白毛アレ𪜈。前条種ノ如ク多カラズ。又草形同フシテ毛尤少ク小也。背𦰡苗莖實ニ於テハ一般異ナラ。根ハ木様ノ塊ヲナシ小指ノ如メ尖リ。肉褐色味微渋ニメ前条種ノ無味ナルガ如クナラズ

(カバライコ)委陵菜

(35) TSUCHIGURI; A. BUKURYŌSŌ.
POTENTILLA DISCOLOR BUNGE.
(ROSACEAE.)

七十二圖五回

三十八

平沐作歲

（卅五）ツチグリイ　ブクリヤウサウ　雞腿児　蠭白草〔薔薇科〕

傳云薩州産ト。葉地ニ塌シテ叢生シ。形披針状ニノ奇鋸歯アリテ一鰭ヲ抽キ。茎葉背柄共ニ白毛尤多ク。殆ト純白ナル如クナス。茎葉光リ。葉面深緑色葉間茎ヲ抽キ地ニツイテ擡頭尺許。二三ノ小葉並ニ柄本ニ数朶ノ托葉アリ。茎頭分枝黄花ヲ放ク。瓣蓼雨蕊實形芽。委陵菜（カハラサイコ）ト同ク。根ハ彼ノ如ク長カラズ。只鬚根ヲ出シツノ先ニ玉圃（ホド）児ノ如キ圓塊数顆ヲ生ス。赤皮白肉ニノ苦渋ナラズ。ヨク生食ス

(34) KAWARASAIKO.
POTENTILLA CHINENSIS SER.
(ROSACEAE.)

原野沙地ニ多シ。葉ハ多ノ小葉ヲ以テ鰭様ヲナス。小鰭鋸歯深ク尖鋭缺刻アッテ

殆ト重鰭ノ看アリ面緑色背白色柄茎共ニ白毛茸アリ。簇葉間茎ヲ抽ク丁尺餘。梢

上枝ヲ分チ。股間一花并ニ毎頭数花ヲ放ク。五瓣黄色形オ〻ヘビイチゴノ花ノ如ク。

蓁亦同様。實礎雨英ノ形似類ト一般。實熟ヌホオヘビイチゴノ實ノ如シ。根ハ直條

頗ル粗ク長ク。形色略柴胡ノ根ノ如シ。故ニソノ名アリシヨリ遂ニ誤テ代用ス

ルニ至ル。茎鏡龍白草下呰載ノ主治惣テ此類ニ通用スベキハラザイコツチグリノ類ミナ ホテンチルラ *Potentilla*、

ノ茅ニ種ニ挙ル ボテンチルラ *Potentilla* アンセリナ *anserina*. 羅 ガン ミルフルスコーン *Myriophoron*

セリッキ *Lour.* 蘭ノ形状。阿須氏鐸氏ノ圖説ヲ并考フルニ本条並ニ次条ノ類ニ外

ナラザレドモ。孰レヲ正當種トセンヤ未得其断。故ニソノ種類ヲ集ノ挙テ後ノ

考ヲ朔ス

「薔薇科」

(33) MITSUMOTO; MINAMOTOSŌ.
POTENTILLA CRYPTOTAENIAE MAX.
(ROSACEAE.)

三十六 平木生哉

処々高山ニ生ス。莖高サ尺餘葉蛇舎葉ニ似テ三葉一帯ニノ互生。柄本披針状ノニ
葉兩側ニ一小葉ヲツクルフアリ。莖柄共ニ微毛ア
リ。蔓ニ重ニノ十片。外者披針状内者卵圓ニノ尖リ。花蛇苺ニ似テ稍小瓣頂圓ノ缺
四ナク。實礎兩裂ハ似類一般。實柔女陵菜ノ實如シ。根赤委陵菜ニ似テ小長サ僅ニ一
寸許

狼牙

（薔薇科）

茅二十五種

ポテンチルラ　モンスペリーンシス

Potentilla monspeliensis. 羅

モントベルリールス

montbellius ガンセリッノ

Gayerius. 蘭

(32) OHEBI-ICHIGO.
POTENTILLA INCLINATA. WILL. V?
(ROSACEAE.)

三十五 木之五

(卅二)ト　オヘビイチゴ　蛇含　五児頭苗

〔薔薇科〕

田野路旁ニ多ク生シ。根葉叢生一帯五葉長柄上ニアリ。形加葉ノ如ク。面深緑背淡緑白色。又七八葉ヲ一帯ニツクル抽ク。初メ春未葉間数茎ヲ多クハ雨對シ。ソノ本ニ鱗様細小ノ数葉ノ苞アリテ枝又如ク潤カラズ。披針状ニノ全ク十葉蔓ノ如ク。花蛇苺花ヨリ小ニシテ三葉ニノ蛇苺ノ如クメイコノ実ノ如ク。蛇苺ノ紅熟ス一花梗ヲ出ス。蔓ナルト不同

蛇含　レプタンス　*Potentilla reptans.*

羅　*Keuiben Geyerii*　ゲンセリックコロイベンド　鐸氏

按鐸氏并卯巣園等ヲ撿ルニ。オヘビイチゴヨリハ茎延長スルモノヽ如クナレトモ。他ノ形状些異ナケレバ。タトヒ正當ナラザルモソノ一種タルニ外ナラズ。根ヲ煎服ノ赤利ヲ治シ。又含漱薬トナスヘシ

菊

(31) KOGANE-ICHIGO.
POTENTILLA CENTIGRANA MAX.
(ROSACEAE.)

（卅二）コガ子イチゴ　蛇苺一種

亦北地山中ニ産ス。ヘビイチゴノ一種ニメ荃地ニ延テ処々ニ根ヲ下シカブヲナシ。フノ葉腋ヨリ一梗ヲ出シ。花ヲ開キ實ヲ結ブノ形色惣テ常種ト同シケレドモ。葉共ニ稍強厚ニメ鋸歯細尖重復ナルノ殊標アリ

〔薔薇科〕

(30) HIME-HEBI-ICHIGO.
POTENTILLA REPTANS L. VAR. TRIFOLIOLATA MIQ.
(ROSACEAE.)

（三十）ヒメヘビイチゴ　蛇苺一種

草形常種ノヘビイチゴニ似テ尤小ニメ。葉背微ク白ク。花形實狀亦常種ニ異ナラズメ。花ノ大サ僅ニ三分ニ不過。此種北地山中ニアリテ。近道野生ヲ見ルヲ不見

〔薔薇科〕

(29) HEBI-ICHIGO; KUCHINAWA-ICHIGO.

FRAGARIA INDICA ANDR. B. WALLICHII FR. ET SAV.

(ROSACEAE.)

按オランダイチゴノ類ハ簇葉間ニ莖ヲ抽キ枝分シ数花ヲ攅生シ。本条ハ。莖塲地蔓延シ毎葉腋有梗一花ヲ放クノ殊標アリ。ソノ実紅熟スルニ至テハ。オランダイチゴノ属ニ外ナラズシテ。或ハ

モノピルラ　エーシブラーチフ　アールドベジー
monophylla　ambiguus　arguta

羅林氏所説精シカラザレバ。須ク諸書参考ヲ要ス

第二種　フラガリア
Fragaria

蘭ニ當ルガ如クナレド。

蛇苺　〔薔薇科〕

（廿九）ヘビイチゴ　又クチナハイチゴ

原野甚タ多ク。秋新苗ヲ生シ地上ニ蔓延シ。葉ハ長柄ニメ一帯三葉（形心蔵状ニメ粗鋸歯アリ。微毛首アツテ滑ナラズ。互生ナレ𪜈時ニ對生アリ。正二月ノ際葉腋ニ二寸許ノ梗ヲ出シ。各頂一花。萼ニ重ニメ十片。外者ハ赤潤フメ三四尖ヲナシ。ソノ形恰モ葉ノ如クシテ萼葉或ハ内者ハ卵圓尖鋭。花瓣黄色圓メ尖微缺。子房ハ花巣ト称スベキモノヽ如シ。細杜ヲ布キ。雄蕊二十ニメ黄葯。此種類ノ生殖部大抵ラナ然リ。而メ各々些異ナキニアラズ。此葯ハ扁圓。委陵菜（カハラサイコ）ニアツテハ差長ガ如シ。實ハナラダイチゴノ実ノ如メ小。大サ六七分熟メ紅色。味不佳ニメ食フニ堪ヘズ。一種茎葉稍小ニメ黄色ヲ帯ヒ。實初メ白ク熟メ黄色トナルモノアリ。尾州員郭ノ地ニ産シテ之ヲキボウズトモ云。又毎葉五箇一帯ニツキテ。殆トオヘビイチゴノ蔓延シ。葉間花實ヲナスモノアリ」　附　全花郭大圖

(28) NŌGO-ICHIGO.
FRAGARIA.
(ROSACEAE.)



(廿八) ノウゴイチゴ　蛇苺

我州能郷山嶺ニ生ス。長柄上一帯三葉。形普常ノ蛇苺(ビイチゴ)ノ葉ノ如メ小。質差厚ク面緑白背渋白ニメ粗鋸歯アル[ナ]。頗ル美ナリ。根際寸許ノ細梗ニ三ヲ出シ。毎頭一花ヲツク。捨圓七瓣、間六冬ヲ凌テ不枯。春夏ノ際葉間寸許ノ細梗ニ三ヲ出シ。毎頭一花ヲツク。捨圓七瓣、間六或ハ八瓣如クメ小ニメ微長。紅白色ニメ大サ五六分。蕚十片。兩芸ノ形似類一般。實熟メ深紅。形オランダイチゴノ如クメ小ニメ微長。紅陷凹ノ心ニ各一子ヲ填シ。味厚カラザレ[ド]モ酸甘オランダイチゴニ勝ル。根際長ク紅糸ヲ延キ曲ッ分ツノ一種ニメ西書中未見載此種

亦前条ノ一種ニメ西書中未見載此種

〔薔薇科〕

(27) SHIRO-HANA-NO-HEBI-ICHIGŌ.
FRAGARIA CHILENSIS ERH.
(ROSACEAE.)

（廿七）シロハナノヘビイチゴ　蛇苺一種

〔薔薇科〕

余未ダ不可笑タクノ産処ヲ詳ニセズ草形花萼ノ状オランダイチゴニ同メ小。葉背柄共ニ筆纖細軟毛アリ。花白色五辨大サ六七分。時ニ六辨ヲ交ユ。苺ハ常種ノヘビイチゴノ實ノ如クメ微大。此種赤根除ヨリ糸蔓ヲ出シ。処々ニ葉ヲ出シ根ヲ下シ苗ヲ帯實微ク長シテドモ。ソノ葉間ヨリ花ヲ出スコトナシ。一種乗鞍山ニ産スル者ハ。花裏レバ微紅色ヲ帯實微ク長シ

按ズ前条下所載ノ（ロイゲ）Ruige. ナルモノナラン林氏云（ロイゲ）Ruige. ハ（タムメ）Tummel. ヨリハ

(26) ORANDA-ICHIGO.

FRAGARIA CHILENSIS ERH. VAR. ANÁNASSA.

(ROSACEAE.)

二十八

POLYGYNIA.

(廿六) オランダイチゴ　蛇苺一種

蘭種ニメ柄長サ五七寸。一茎三葉形心蔵状ニメ粗鋸歯アリ。柄葉背共ニ微ク繊毛アリ。簇葉間花茎ヲ抽ク一尺許。梢頭数梗葉披針状。花瓣白色大サ一寸餘。子房深シ。實熟シテ點頭。形頗大ニメ粒平塌突起セズ。色不美。此種蛇苺ノ如ク莖蔓延セズ簇葉根際ヨリ長ク糸蔓ヲ延キ処々ニ新苗ヲ分ツ。已下二種亦ソノ趣ヲ同シフス」　附両葉郭大圖

第一種

フラガリア　スヘスカ
Fragaria Vesca. 羅　ゲウヲーン
Geum Urbanum. ウヰルデ。
タムメ
Tormentilla. Wilde.

按林氏此条下ニ。其種ヲ得ズ。「ウヰルデ」ナルハ本条ニ當ル。「タムメ」ナルハ未タ詳ニセズ。「ロイゲ」ハ次条ニ當ル。林氏云。第一種ハ專ラ食料菜用ニ供シ稍強心ノ功アリ。第三種ハ清涼ノ能アリ。子ハ砕テ琵布ヲ製シ燃腫ニ貼ノ利アリ。

アールドベジー　コロイド
Aruncus Rivii. 蘭　ロイゲ。
Rivige.

ノ三種ヲ挙。ソノ「タムメ」ナルハ未タ詳ニセズ。「ロイゲ」ハ次条ニ當ル。林氏云。第一種ハ專

(25) TSURUNA.
TETRAGONIA EXPANSA AIT.
(FICOIDEAE.)

TETRAGYNIA.

(十五) ツルナ 蘩菜

海辺沙場ニ生ス。實ヲ取テ蔬圃ニ移シテ亦繁殖ス。莖一二尺初メ横ニ地シテ直立セズ。葉蔇(アカザ)葉ニ似テ本未共ニホソク。多肉鬆疏。面背共ニ滑ナラスシテ色浅緑差鹹味アリ。毎葉腋ニ短梗一花或ハ二花ヲ并ヘ。又共ニ枝ヲ出ス。蕚鐘状或五趾アリ。頭四裂開展。表浅緑裏黄色ニメ別ニ花瓣ナシ。子室蕚ニ蔵レ四五ノ細白仁アリ。附メ反シ。雄蕊十二或十五六。蕚ノ内側ニ出テ黄色。花底牀面粟紋アリ。實熟ノ菱実ノ小ナル如シ。内ニ四柱或五柱

テトラゴニア
tetragonia

イヤポニカ
cigoroides.

春月 全花郭大圖

〔蘩菜科〕

SHIMOTSUKESŌ.
SPIREAE PALMATA TH.
(ROSACEAE.)

(廿四) シモツケサウ

形狀詳前条下

繡線菊

〔薔薇科〕

(23)



NATSU-YUKISŌ.

SPIRAEA PALMATA TH.F.

HORTENSIS.

(ROSACEAE.)

TRIGYNIA.

ICOSANDRIA.

草部 第十二綱 多雄蕊附蘂

イコサンドリア

〔薔薇科〕

（廿三）

シモツユキサウ

脚葉共ニ長柄ノミニメシタヒ葉ノ掌様ニメ重復不育ノ尖鋸歯アレ圧。此種ハ根葉ガノコトクナク。シモツケサウト同類ニメ。共ニ葉掌殆ト鰭様ヲナシ。托葉亦大ニ花色淡紅。ナツユキハ。紅白ニ種アリテ。紅花ナルヲ京粒状ニメ聚接シ。各一柱ニメ結頭アリ。多雄蘂ニツキ蘂黄色」附全花郭大圖呼爲未詳

(22) NISHIKISŌ.

EUPHORBIA HUMIFUSA W.

(EUPHORBIACEAE

二十四

（廿二）ニシキサウ　地綿

田野園中ニ生スル小草ニメ。夏苗ヲ生ジ秋ニ至テ盛ナリ。根際ヨリ多枝ニ分レ。地ニ敷テ擡頭セズ。葉兩對形捲圓ニメユガミ至細ノ鋸歯アリ。葉腋枝ヲ出シ枝股葉腋共ニ花ヲツクルノ形大戟類ノ如ク。苞形亦一般。蓼鐘様五裂雌蕊長ク瓣外ニ出テ枉リ。頭ニ三楞三角ノ子室アッテ。頂上三柱毎柱二分スルアリ。雄蕊三茎葯分乂様色暗紫ニメ黄粉ヲ吐ク。ソノ草狀大小大戟ノ類ト大ニ異レ𠮟。花實ニアッテハ全クソノ趣ヲ同シ。旦茎葉共ニ切テ白乳ヲ出スヿ赤同シケレバ。之ヲ「エウホルビウム」ノ屬ニ收ノザルベカラズ。鐸氏云。此種性酷烈ナルヿ大戟類ト同シ。故ニ自然汁ヲ塗擦シテヨク疣贅類ノ息肉ヲ除ク」

附一一枝　二子室并蓼　三兩蕊共郭大圀

第二十四種　羅

エウホルビア　カマシセ　ウヨルフスメルク

Euphorbia chamaesyce, Linn. Sp. pl. 651.

又　ケレイシステ　リツ

Ex Kleyeria Lycopodioides melle.

按西勃氏。林氏二十一種ノ内ヨリ以テ本条トスレ𠮟不穏

鐸氏

蘭　鐸氏圀可證

(21) HORUTOSŌ.
EUPHORBIA LATHYRIS L
(EUPHORBIACEAE.)

（廿一）　續隨子　〔大戟科〕
ホルトサウ

啓蒙圣葉花實ノ形ヲ説ク丁尤詳明。故ニ畧之。但梢上五葉ニメ五枝ヲ分ツトハモノハ。其肥大ナルモノニ因ル。多ク八四葉四枝ヲ常トス。故ニ林氏亦四葉ヲ正トス。此種大戟耳遂ノ同屬ナレハ。想テ一家ノ殊標アリ。花形ハ大抵同様ナレハ。萼鐘様ニメ四裂シ。頭兩起アッテ差ヤ鈎月ノ形ノ如ク。花弁ハ披針状ニメ尖微裂アリ。實礎円メ三起。柱三ニメ頭二裂。實熟メ黒褐色円メ大サ四五分三已ニメ三子アリ。子蔴子ト同シ。阿須氏呀圀ノ花形恐非除ク。子味亦同メ峻下ノ性アルヿ蔴子ニ似テ小。林氏云葉ノ白汁味甘メヨク疣贅ヲ晩催起ニ用テ功アリ　附一全花二萼共郭大圀

三十五種
エウホルビア
euphorbe
ラチリス
tithymale
スプリンジコロイド
spurge

羅
蘭

(20) IWA-TAIGEKI.
EUPHORBIA.
(EUPHORBIACEAE.)

平木全載　二十二回

（二十）イハタイゲキ　紅（アカメ）茅大戟

伊豆等ノ海邊石間ニ生ス。晩秋ヨリ新芽ヲ生シ色紅紫。葉ハ狹長白緑色ニメ邊縁紫暈アリ。寒キ間ハ葉背紫色莖紅紫。春暖ニ至レバ漸ク淡緑ニ変ス。莖高一二尺。葉密々散布。梢上ホ多葉攅簇シ。葉腋毎ニ一梗ヲ出シ花アリ。辨萼裝狀ニ異アルコト

〔大戟科〕

二十一圖二回

SENDAI-TAIGEKI.
EUPHORBIA JOLKINI BOISS
(EUPHORBIACEAE)

(十九) センダイゲキ

〔大戟科〕

此種ハ莖及ヒ葉ハ大戟等ト同時ニ花アリ。莖色暗紅ナルヿ伊豆産ヨリ深ク。葉散布シテ伊豆産ノ密布スルガ如クナラズ。色緑色ニメ中筋白色。新葉ニ紅紫暈アリ。又梢上及盖下ノ一二葉腋ヨリモ花梗ヲ出シ。ソノ下ノニ三葉腋ヨリハ小枝ヲ出シ葉ヲツクルヿ。草簡茹(ウルシ)ノ如ク。又花ヲ色ムラ尖鋭ニメ淺黄ナルト同シカラズ。又蕚頭微凹ニメ小葉扁尖ニメ帶紅色。他種ノ溜短根長ク延テ遠ク苗ヲ分ツ等ノ殊標アリ

(18) HARU-TAIGEKI.
EUPHORBIA LASIOCAULA BOISS VAR.
(EUPHORBIACEAE.)

（十八）ハルタイゲキ

産処未詳。草状伊吹等ニ産スル細葉大戟ト略同シクシテ。全体ノ高一尺餘ニ過ズ。三月頃遂ト同ク花アリテ殆ト丹遂ニ相似レ氏。萼形鈎月様ナラスシテ惣テ大戟花ニ同シ。故ニ別ニ詳圖ヲ不載。梢黄菓腋梗ヲ出セ氏。伊吹産ノ如ク花梗長ク相重ルニ至ラズ

(17)

(十七)イブキタイゲキ

伊吹山金生山等ニ多ク生ス。莖高二尺許細ク剛クメ赤色ヲ帶ビ。葉小ニノ長一寸餘ニメ互生。梢頂三五葉ヲ攢簇シ。每葉一枝々上ニ三葉ニメ三枝上。ニ葉アツテ一花ヲ放ク。花側又一梗ヲ出シ。又二葉ニメ一花アツテ往々續隨テ如ク十數相重ルニ至ルモノアリ。又蓋下ノ葉腋処々ヨリ枝ヲ出シ亦花ヲツク

〔大戯科〕

(十六) ハクサンタイゲキ

莖頗ル粗ク高二尺許。多葉散布シ差大ニメ色深緑。中筋粗メ白色。梢ノ葉上一小枝ヲ出シ長ニ三寸。上ニ三葉ヲ對シ葉心又二三小葉ヲ出ス。又上二葉腋ニ枝ヲ出サズ

〔大戟科〕

(15) TAKATŌDAI.
EUPHORBIA ADENOPHORA.
(EUPHORBIACEAE.)

巻之九 十一冊 二日
十七
平林彫藏

（十五）タカトウダイ　大戟

簡茹大戟并遂澤漆續隨子等ハ。同一屬ニメ形狀略一樣ナレ𪜈。各々殊標アツテ真ニ分別ヲナス。就中大戟ハ。産地ニヨツテ大ニ草簡茹ヨリハ莖シマリテ差ヤ剛ク。莖ニ毛アレ𪜈微々無キガ如ク。夏ニ至テ盛ニ秋ニ至テ漸ク衰フヲ常トス。普ク栽テ漢種ト称シ。又取ニソノ莖紫色ヲ帶ルヲ以テ謾ニ紫大戟ト称スル品ハ。吾近境木曽川堤上ニモ多ク自生シ。肥タルハ高三四尺。瘠タルハ纔ニ一尺餘ニメヨク花ヲツク。多葉散布シ梢頂五葉攢簇蓋ヲナシ。蓋上五小枝ニ分レ各三葉ヲ對シ。又三又ニ分レ。毎又又二葉ヲ對シ數層ヲナシ。各略ス。又蓋下ノニ三葉腋ヨリモ枝ヲ出シ花ヲ開ク。此種白山種ヨリハ葉小ニメ中筋粗トカラス。尤伊吹赤坂等ノ種ニ似テ稍大ナリ。大戟ノ多種ナル。一般ナラザレバ。功用亦一樣ナルベカラサレ𪜈。余未ダソノ詳ニスルノ暇ヲ不得。今只數種ヲ掲テ以テ後日ノ考資トス」

〔大戟科〕

(14) TŌDAIGUSA.
EUPHORBIA HELIOSCOPIA L.
(EUPHORBIACEAE.)

十六

（十四）トウダイグサ　澤瀉

八九月實生シ。春ニ至テ一根數莖ヲ出ス高尺許。葉互生形倒蛋形ニメ微細鋸歯アリ。莖大戟類ト同ク。莖葉ヲ摘メハ白汁ヲ出ス。三月莖頭五葉ヲ對生シ。上ニ五枝ヲ分チ。每頭大小三葉ヲ對シ三枝ヲ出シ。葉ノ大小ニ從テ枝ホ長短アリ　每頭二葉對シ二亜ニ分レ。其頭又二葉ヲ對シ二ノ短梗花ヲ開ク。分枝ノ中心ホ雄性花ヲ出ス。蒴扁圓四片黄緑色。辮蓋黄色子室ノ形等惣テ大戟ト同シ

四十八種

エユポルビア　ヘリヨスコピア　羅　ソンチウエンヂフ

euphorbia helioscopia.

ウヨルフスメルク

euphorbium mellis.

蘭

(13) HAGIKUSŌ.
EUPHORBIA.
(EUPHORBIACEAE.)

十五

(十三) ハギクサウ

余未詳産処。或云海濱ニアリ。莖高五七寸。葉互逐ノ葉ノ如クメ小ニメ密附シ。頗菊花ノ態アリ。故ニ葉ギクサウノ名アリ。莖頭心蔵状葉三筒ツヽ宛容通ニ重ニ對生シ。毎葉上五七分ノ細莖ヲ出シ。殆ト一織ノ如シ。細莖頭扁田ノ二葉相對シ。中心一花両側又細莖ヲ出シ花ヲ放ツ。花織心一雄花ヲツケ互逐ノ如ク。其ノ両端少ク尖起アツテ差ヤ互逐ノ葉ト同シ。蕚片細莖ヲ出シ花ヲツケ互逐ノ鉤月様ナルノ態アリ。又織下一二ノ葉腋亦花候亦互逐ト同時ナレバ。互逐ノ一種ニ不外カ如シ」

附 全花郭大圖

(12)

ŌBA-KANDZUI.
EUPHORBIA SIEBOLDIANA F.
GRANDIFOLIA.
(EUPHORBIACEAE.)

明治十一年四月十日 平木全成

(十二)オホバカンゾ井

西濃処々山陰渓間ニ生ス。茎高一尺餘。全体軟ニメノウルシノ類ノ如ク。葉卵圓披針状ニメノウルシノ葉ヨリ濶ク。茎ニ四五葉ヲ互生シ。梢頭五葉ヲ冠次シ。頂上五細茎毎頭二葉中心一細茎ヲ出シ。二葉一花。又茎ノ両側ヨリ一細茎ヲ出シ。二葉腋亦同ク花ヲ出ス。萼鐘状邊縁四出。鉤月様ナルヿ上条ト同形。雄蕊六子室柱形亦一般ニメ色淡黄緑」附一全花二雄蕊

(11) NATSU-TŌDAI.
EUPHORBIA SIEBOLDIANA MORR. ET DEC.
(EUPHORBIACEAE.)

（十一）ナツトウダイ　科遂

早春宿根ヨリ芽ヲ叢生シ。色帯紅。圓茎高尺許鈍披針状葉ヲ散布スヲ以テ一盖ヲナシ。上ニ五細茎ヲ繖状ニ出シ。毎頭二葉本瀦ク未タ花アリ萼鐘状。邊縁四裂ノ八尖ヲナスヿ。恰モ四鈎月ヲ併スガ如ク。内側ノ雌庁亦数尖起ヲナシ色黄、赤。子室圓尖鈍三稜ニノ。頭上三柱。毎頭二裂色紅紫。雄蕊五ニノ黄約。草状啓蒙詳之可併見」附一全花二蕊雌片共郭大圖

按鐸氏ヨスユラ

又ピリユラ

ルモノ、如シ宜ク他書ノ参考ヲ要ス

〔大戟科〕

(10) RYOJO.
EUPHORBIA.
(EUPHORBIACEAE.)



巻之八 十一綱二目

十三

平沫全載

（十）リョジョ　漆頭蘭茹

冬未春初宿根ヨリ芽ヲ叢生ス。色紅紫ヲ帯テ頗ル美ナリ二月ノ頃圓茎高一尺余葉ヲ散布ス。形ノウルシノ如クメ稍小。未鈍ニメ深緑筋脉白色。背ニ微毛アリ。時ニ紅紫色漸ク褪キ僅ニ茎頂五六葉蓋ヲナシ。葉未ニソノ餘ヲ見ル。茎上細茎ヲ出シ毎頭濶短ニ小葉相對シ。内ニ一花ヲ擁ス。形ノウルシノ花ノ如クメ弁色帯緑ニメ淡黄ナラズ。又鱗片頭尖鋭ナラズ。子室上ニ疣瘉ナク。其他兩蘆ノ形數等ニアツテハノウルシト一般。小茎心別ニ一花アルヿ亦同シ。此品毎葉腋ヨリ茎ヲ出シ各頭一花ヲ放ク。根ハノウルシヨリ粗ノ小蘿蔔ノ如ク。色黄ニメ微黒ヲ帯ビ切レバ黄汁ヲ出ス」附去兩蘆諦視辨蓼形郭大圖

按鐸氏所挙ノ　ウェルフスメルツ　Wolfsmelk.　ノ圖説本条ニ的當ナル如シ宜他書ノ参考ヲ得テ之ヲ決スベシ

NO-URUSHI.

EUPHORBIA PALUSTRIS L.

(EUPHORBIACEAE.)

モノハ。子室ヲ不具。ホ撒中ノモノハ多クハ具ス。惣テ似類ノ品。花ニ之ヲ此ニ詳説ス。又ソノ肥瘠ニヨツテ。梢上ノ五葉或ハ三。又小撒花梗ヲ挟テ二小荃ヲ出シ各二葉一花ヲ開キ。或ハ葉腋枝ヲ出シアリ。瓣萼子室ヒナ淡黄帯緑色。後ニ至テ黄色更ニ加ル。已ニノ小地五月ノ除苗枯ル。根直ニメ梗頗ル粗大ナリ。此種類ハミナ荃葉ヲ切レバ白汁ヲ滴ス」

附全花郭大圖

按茼茹大戟耳遂ノ類。共ニ *Euphorbia.* ユウホルビア

カヽル。鐸氏十餘種。林氏六十四種ヲ挙レバ。ソノ中本邦所在ノ品ニ的當ナルモノ多カラン。然レドモソノ諸種ノ形状彷彿眩迷シテ遽ニ決シガタシ。故ニ姑期他日之考

Wolfsmilch. ウヲルフスメルク 蘭ノ属ニ 羅

（九）ノウルシ

水澤濕地ノ地ニ生ジ。早春芽ヲ叢生シ初メ淡紅色ノ帶ブ。圓莖高サ二三尺。葉金絲桃（ヤナギ）葉ニ似テ狹メ微毛アリ。莖ニ多葉散布シ梢上ニ五葉ヲ冠次ス。上ニ五亜ヲ撒出シ各二三寸。每頂濶短ナル三葉アツテ上ニ細莖ヲ出シ。莖頭ニ小葉々心一花ヲツク。蓼鐘狀上緣四片ニ分レテ外反ス。形扁ニメ差半規形ヲナス。ソノ内側ニ數尖ル。鱗様ノ四花瓣アツテ花心ニ向フ。蒴茹大戟耳遂ノ類花形一殊態アリテソノ形只蓼頭ノ四片ヲサシテ花瓣ト見。筒内鱗形狀分晰ナリガタシ。故ニ林氏阿須氏ニ於テモ如ク。ソノ内ニ數尖ル

(8) KINMIDZUHIKI.
AGRIMONIA VISCIDULA BUNGE.
(ROSACEAE.)


一

二

（八）キンミヅヒキ　龍芽草

原野ニ多ク生ズ。莖高ニ三尺。單鰐葉ヲ互生ス。ソノ鰐鋸齒アル大小葉ヲ以テ交ヘ成ル。犬抵大葉三對小葉ノ間ニ交リ。柄本ニ缺刻鋸齒アル托葉アリ。葉腋枝ヲ出シ。莖梢赤數亜ヲ生シ。夏ニ至テ共ニ穗ヲナシ花ヲ綴ル。萼鍾様五夫。梗ニ小鱗葉。萼ニ短針状葉アッテ覆之。花卵圓五瓣黄色。雄蕊十二葯深黄色。子室半萼ニ藏レテ二柱頭開哆。花后實アリ。刺毛アッテ人衣ニ著ク」附一兩蓝

第一種

アグリモニア　ゲメーネ　羅　*Agrimonia Eupatoria.*

ヱユパトリアアグリモニー子　*Agrimonia Eupatoria.*

蘭

(7) KAN-AOI.
ASARUM BLUMEI DUCH.
(ARISTOLOCHIEAE.)

一 二 三

（七）カンアフヒ　杜衡

形状啓蒙ニ詳説スル故ニ略之根際ニ冬ヨリ花アリ。無梗ニメ形略細辛花ノ如クナレ𪜈。筒稍長ク淡黄緑白色ニメ暗紫ヲ帯フ。縁三裂ニメ尖リ。外反スルニ至ラズ。瓣内暗紫色。中心六裂柱上リ立チ。各尖又綿ニ二裂シ。其本ノ背ニ蜜腺アリテ。柱頭ノ用ヲナス。雄蕊短クメ長葯。色淡黄ニメ白粉ヲ吐キ球下ニ位シ。長短十二茎相間メ柱ヲ圍ム。ソノ状細辛ト別ニ一異趣ヲナス。又苞蓼二葉アツテ。ソノ内ヨリ一新葉ヲ出ス」

大圖

〔馬兜鈴科〕

第三種　ヒルギニクユム　ヒルギニス　ヲール

アサルユム　羅　Asarum Virginicum, Asarum Virginicum — cordatum — mas — core

按春氏此名下ニ云ウスバ細辛ノ名ヲ下可疑

蘭

FUTABA-AOI; KAMO-AOI.
ASARUM CAULESCENS MAX.
(ARISTOLOCHIEAE)

（六）フタバアフヒ　カモアフヒ

行根地上ニ延キ。処々ニ鬚根ヲ出シ。フノ処ヨリ一柄ヲ抽ク丁二寸餘ニメ。又分シ上ル丁三四寸。各頭一葉。形細辛ニ似タレ氏稍圓扁ニメ尖リ。光澤アツテ脉理分明。柄又股ノ間ヨリ一梗ヲ出ス丁一寸許ニテ花アリ。ホ細辛類ト殆ト同メ。本夫リ漸クヒロガリ。弁稍長ク。柱頭絶ニ六裂外反ス。雄蕊十二双耳葯。細辛杜衡ミナ一柄根際ニアツテ直ニ又分ス。此種ハ地上ル丁二寸ニメ分ル、並ノ状顕著ナリ。是以テ特リ此品ニフタバアフヒノ稱アリ。一種小葉ニメ高二三寸ニ不過モノアリ」

第二種　カナダース　マニス　ヲール

アサルユム　カナデンセ

Cyclotum canadense. 羅 Canadian Asarabacch mens — ooe.

蘭

(5) TŌ-SAISHIN.
ASARUM SIEBOLDI FOL. CORIACEIS.
(ARISTOLOCHIEAE.)

（五）タウサイシ　花戸　〔馬兜鈴科〕

漫ニ漢種ノ称アレ𪜈。余未詳産処。葉形質上条ト略同ノ。花筒稍長キノ異アリ」

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF WYOMING
LARAMIE

(4) USUBA-SAISHIN.
ASARUM SIEBOLDI MIQ.
(ARISTOLOCHIEAE.)

（四）ウスバサイシン　細辛

葉杜衡（カントウ）ノ如ナレ𪜈稍薄ノ。光澤ナク斑紋ナク冬葉ナシ。故ニウスバ細辛ノ俗称アリ。根際ヨリ二葉双生スレ𪜈カモアフヒト同様ナレ𪜈。葉柄稍短シ。惣テ此類ノ雌蕊ハ。一柱太フメ梗ヲ出シ花アリ。花被ニメ鐘状縁三裂尖外捲スルノ形。カモ如ク。頭側ニ向ヒ雄蕊十二ニメ柱外ヲ圍ム。葯紫色ニメ開綻黄粉ヲ吐ク　附両蕊佐置郭大函　林氏云。葉根共ニ薬用ニ供ス。惣テ烈キ佳香アリテ味苦辛。用量少ケレバ利尿催経又凝血ヲ釋キ肺ニ利アリ。多量殊ニ酒浸ナルハ。賢鋭敏ナルニハ用ベカラズ。吐ヲ催起ス。故ニ腦「ロート」ニ至ル。軽キ者ハ「ロート」二銭強。浸剤ハ一「ロート」二銭。葉ハニ三「ロート」ヨリ一「ロート」ニ至ル。軽キ者ハ根未五分ヨリ一銭。濃煎スレバ下利シ。濃煎スレバ只利尿シ莊萇タル沈痾ニ功アリ。然𪜈ソノ功用ハ体質ニ従テ不一。用之須ク慎ムベシ。搾汁ニ在ツテハ尤然リ。又腱菜トシテ持久頭痛ヲ治ルノ名アリ」

第一種

アサルエヘ　ヨウロッパユヘ　Asarum europæum.

羅　Asarabacca.

按或林氏所載ノ第一種ヲ以テフタバアフヒト為シ。第二種ヲ以テ本条ニ當ル者亦可ナルガ如シ。余孰カ是ナルヲ知ラズ。故ニ記シテ後賢ノ断ヲ俟ツ

蘭

(3) DZUDAYAKUSHU.

TIARELLA POLYPHYLLA DON.

(SAXIFRAGEAE.)

〔虎耳草科〕

（三）ゾダヤクシ 山巌陰地ニ生ス。葉恰モメユキノシタニ似テ短クメ薄。緑色ニメ不整帯紫赤刺毛甚アリ 五月葉間ニ莖ヲ抽キ七八寸。ニ三葉ヲ互生シ梢ニ疎穂状ニ細梗花ヲ綴ル。花被ニメ鐘状五裂。子室ヲ被テ披開セズ。白色ニメ細紅點アリ。梗紅紫色。子室柯子状ニメ長ク頸延テ一柱ヲナス。細撿之ニ披針状ノ大小ニ片ノ併合ニナリテ内ニ多ク圓長細子ヲ收ム。ソノ状一奇。即コレ此草ノ標徴ニメ。ユキノシタ類ト不同処ナリ。雄蕊十五約淡黄褐色 附 一盛花 二花稍衰子室漸長者

所屬未考

共郭大圖

MISOHAGI.
LYTHRUM VIRGATUM L.
(LYTHRARIEAE.)

第之九　○十一圖一冊　平木甘藏

溝瀆ノ畔ニ生ス。莖方ニメ線稜アリ。高三四尺。葉柳葉ノ如メ對生。葉腋ニ短梗三五花ヲ簇生シテ穗ヲナス。蒴筒様ニメ稜條アッテ六尖。ソノ尖間ニ向フ。落花後尖内ニ向テ口ヲ塞キ。針狀細葉アッテ側ニ向フ。落花後尖内ニ向テ口ヲ塞キ。針狀葉微々起テ角様ヲナス。花卵圓六瓣淡紅紫色。子室麥粒狀。一柱長メ菌頭雄蕊六者長ク喉外ニ出。六者短メ筒中ニ潛ム。共ニ黄藥アリ。一種花形稍小ニメ色淡。殆ト白色ナルアリ」

附蒴果部大圖

第一種

サリカリア

ラ

ゲアーイルデ

Galium Aparine.

パルテーケ

Parthe.

蘭

(1) SUBERI-HIYU.
PORTULACA OLERACEA L.
(PORTULACACEAE.)

卷之九

〇十一圖一目

二

平水左武

MONOGYNIA.

〔馬歯莧科〕

（一）スベリヒユ　馬歯莧

田園普ク自生ス。莖圓ク帶赤色。地ニ布テ直立セズ。全草肥厚多液。葉楕圓ニメ長五七分。互生。花ハ莖頭葉腋ニ三五花ヲ簇生ス。萼鐘狀ニメ圓尖二葉。花亦鐘狀五裂雄蘂十二ニメ一柱頭五裂雄蘂ハ花開キ午前ニ至テ閉ヅ。花後萼菓落テ子萼中ニ熟シ細ニメ黑色。又種植ノ一種アリ。全菓頗ル大ニメ高尺許ニ及テ他ノ異ヲ不見。故ニ不載別圖。即漢人所謂猪耳草コレナリ。

林氏亦ウヰルデナウヰ野生タムメ tamne. 種植トノ二種ヲ擧クルハ猪耳草ニアタル。林氏云。稚草ヲ採テ煮或ハ蒸シ食フ。無毒美味ニメ大便ヲ軟ク。煎汁搾液等ハ。諸般ノ内臟燃衝ニ利アリ。殊ニ石淋痛小便艱渋ノ治ニ賞用ス。阿須氏云。全草石鹹採清涼ニメ差ヤ強壯ノ性アリ」附雨蘂郭大圖

第二種　ガラッドブラーヂ　ポルセ〻イレラセア　羅　ポルトユラカ　蘭

Glaucous Purslain.

Portulaca oleracea.

Pourpier.

草木圖說卷九
VOL. IX.

DODECANDRIA.

草部

第十一綱

自十一雄蕊
至二十雄蕊

ドデカンドリア
Dodecandria.

大垣　飯沼慾齋　著述

東京　田中芳男　小野職慤　久保弘道　横川政利　増訂　同校

廿八ノヲゴイチゴ
三十七メヘビイチゴ
卅二オヘビイチゴ
卅四カハラサイコ
卅六ツチグリ一種。
卅八ミツバツチグリ
四十ツルキンバイ
四二ミヤマダイコンサウ
四四ミツモトサウ
四五コガ子イチゴ
四六ツチグリイ
四七オホバツチグリ
四八キジムシロ
四九ダイコンサウ
五十コキンバイ

十四 トウダイグサ
十六 ハクサンタイゲキ
十八 ハルタイゲキ
二十 イハタイゲキ
廿二 ニシキサウ

第十二綱

第三目

廿三 ナツユキサウ

第四目

廿五 ツルナ

第五目

廿六 オランダイチゴ

十五 タカトウダイ
十七 イブキタイゲキ
十九 センダイタイゲキ
廿一 ホルトサウ

廿四 シモツケ

廿七 シロハナノヘビイチゴ

Iinouma, Yokoussai

草木圖說 前篇 卷九 目録

草部

第十一綱

第一目

一 スベリヒユ 二
三 ツダヤクシュ 四
五 タウサイシン 六
七 カシアフヒ

第二目

八 キンミツヒキ 九
十 リヨジヨ 十一
十二 オホバカンヅヽ 十三
ミソハギ
ウスバサイシン
フタバアフヒ
ノウルシ
ナツトウダイ
ハギクサウ

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF WYOMING
LARAMIE

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY
OF WYOMING
LARAMIE

飯沼慾齋著述

新訂草木圖說

草部

九

VOL. IX

Dodecandria 1 @ 22

Icosandria 23 @ 43