

Herbarium
QK
369
.136
1874
v.6

U18100 424 839 1

OK

369

I 36

1874

V. 6

[illegible]

Demco 293-5

草木圖說前篇卷六終

(50)



KEMANSŌ.

DICENTRA SPECTABILIS MIQ.
(PAPAVERACEAE)

(五十) ケマンサウ

荷包牡丹


〔罌粟科〕

春宿根芽ヲ出ス高二尺許。葉略牡丹葉ニ似テ小。殆ト類葉牡丹ノ如クノ微厚。三月葉腋一莖ヲ出シ。扁圓淡紅色ニ細梗アル十數花ヲ下垂シ。穗樣ニ連綴シ。ツノ花上面淡紅色ノ苞ヲ以テ被ヒ。己ニノ二裂シ。尖及シ兩邊ニ分ル、ニ至テ初テ白色ノ花体ヲ露シ。体中子室アリ。扁長莢桶内ニ細子ヲ收ム。雄蕊六莖左右ニ分レ。体外ニ出テ更ニ弯リ集ツテ柱頭ヲ挟ム。ツノ盛花ニ在ツテハ。葯僅ニ体外ニ見ユ。ツノ莖兩側ナルハ膜樣ニシテ中間ニ線樣ノ一莖ヲ挟ム。此花惣テ異樣ニシテ名狀シ難ク。且他ニ比類ノ品ヲ不見。故ニ各々圖載ス。附一去苞見金花体ニ去花瓣見兩莖共本然圖

所屬未詳



NOGIRAN; KITSUNENO-O
METANARTHECIUM LUTEOVIRIDE
MAX
(MELANTHACEAE.)



卷之二
四九ノギラン

キツ子ノオ

〔藜蘆科〕

原野陽地ニ多ク生シ。葉敷地簇生。一窠十余片恰モシヤウジヤウバカマノ如ノ。葉未殺銳背ノ中筋帶白色。夏葉心一茎ヲ抽ク一尺餘。二三垂ヲナシ。短梗花ヲ以テ穗ヲナス一六七寸。每花大小ニノ針樣葉アツテ護之。花無萼六瓣狹長披針狀。白質ニノ中道黃綠ノ一條。及尖ニ茶褐色暈アリ。六雄蕊瓣ニツキ。葯赤黃粉ヲ吐ク。實礎圓長。豎ニ六道アリテ灰白色。頸ニ黃綠斑アリ。延テ一柱ヲナシ赤黃暈アリ。頭菌樣根略葱樣ニメ線根アリ。此種冬ニ至テ葉枯レ。シヤウジヤウバカマノ冬猶青翠ナルト不同。木曾ニハ一種大葉ナルアリ。附子室並柱郭大圖

按シヤウジヤウバカマノ一種ナレバ。春氏ノ說ニ從テ。ホ「スシルラヤホニカ」ノ屬ニ可收。ワノ「スシルラ」ニ近キ一ハ。此種及テシヤウジヤウバカマニ勝ル。葉ヲ採水煎ノ水腫脚氣ノ類ニ用テヨク利尿ス。江州農家某氏ノ秘方ニ出ト云

(48) SHŌJO-BAKAMA.
SUKEROKIA JAPONICA MIQ.
(MELANTHACEAE.)



四八 シヤウジヤウバカマ

粉條兒菜

一藜蘆科

山嶽陰地ニ多ク。草ノギラシニ似テ葉末稍濶クノ尖リ。春葉心一莖ヲ抽クヲ七八寸。箴狀ノ小葉ヲ互生シ。稍末枝分シ短梗十數花ヲ以テ房ヲナス。六瓣披針狀ニノ翹翹シ。六雄蕊瓣外ニ出。葯暗紫ニノ白粉ヲ吐ク。實礎圓長三起。一柱頭菌樣ニノホ三起。花色淡紅紫ニノ。淡濃不一。又白色ナルアリ。根指ノ如ノ小。結節皺紋アツテ白色鬚線多ク。味苦。葉凌冬テ不枯。肥大ノ者ハ。晚秋ニ至テ葉尖毎ニ一稚苗ヲ生シ。地ニツイテヨク生長ス。

スニルラ

ヤホニカ

Scilla

capensis

春氏

(47) NOSHI-RAN.
FLUGGEA JABURAN KUNTH.
(LILIACEAE)

(四七)ノシラン (百合科)

十數葉一窠ヲナス。雞尾蘭ノ如ク。葉

彼ヨリ狹長ニ尺ニ超ヘ。秋葉間ニ扁ナル

花莖ヲ抽ク。一尺餘。梢上穗ヲナシテ花ヲ下垂ス。毎


簇三五花。一小葉アツテ護之。梗一二分。花本細ノ漏斗ノ狀ノ如クナレ。實シテ筒

様ナラズ。半披針狀ノ六裂瓣ヲナシテ外反ス。梗ト共ニ灰色ニシテ微々淡紫碧暈ヲ

帶ブ。子室莖ニ藏レテ一柱。六雄蕊短莖ニシテ長。約。色黃綠。後實ヲ為ス。雞尾蘭ノ如シ。

一種葉間道アルアリ。附全花郭大圖。按此品花形一殊態アツテ雞尾蘭ト不同。兩

莖ノ形略同ク。實ヲナスヤ三起頭アツテ三區ナル。同ク。根形亦相似。バツノ同屬ナル。不待言可知







KEIBIRAN.
DIANELLA
(LILIACEAE.)

四六ケイビラン

〔百合科〕

六七葉一簇ヲナス。形狹長ニメ一側ニ曲リ。背縦理分明頗雞尾ノ形ノ如シ。故ニソノ名アリ。夏中心ニ扁莖ヲ抽ク一尺許。梢三四枝ヲ分チ。短梗無萼花片側ニ倒垂シ穗狀ヲナス。披針狀六瓣白色ニノ背ニ赤褐ノ暈アリ。實礎圓ノ三道アリ。一柱。六雄蕊長ク瓣外ニ出。淡黃葯アリ。勢州紀州等ニ産ス。産處ニヨツテ葉狀花形ニ些異アリ。今二種ノ花形ヲ圖ス 附金花郭大圖

所屬未詳

(45) JANO-HIGE.
FLUGGEA JAPONICA KUNTH.
(LILIACEAE.)



四五 ジヤノヒゲ

小葉麥門冬

〔百合科〕

葉尺許ヨリ二尺許ニ至リ。濶サ一分餘。花披針狀六瓣外反色淡紫。心蕊白色。ノ
尖ニ一縱道アリ。雄蕊六。葯長ノ黃色。實碧色。此一種ニ葉小實亦小ニ夕黑色ナル
アリ。 附兩蕊郭大圖


スラテリア

Statice

ヤポニカ

japonica

埤斯般幾斯氏



YABU-RAN
OPHIPOGON SPICATUS GAWL.
(LILIACEAE)

〔四四〕 ヤブラン

大葉麥門冬

〔百合科〕

葉狹長一二尺巾三四分。漳蘭^{シラン}葉ニ似テ稍軟。葉ハ一茎ヲ
 抽。ホ一ニ尺。初秋短梗花二三ツ、簇生シ以テ穂ヲナス
 一四五寸。花擔圓六瓣。色淡紫紅。萼六葉亦同色。^{萼花辨同}
 以テ。花時見之難認。熟實ノ時ニ。實礎扁圓一柱。頭菌樣。雄
 在テ。ワノ六葉ノ形殆然タリ。蓋六ニメ藥黃色。實ハ櫻子ニ似テ微大ニメ黑色。體根ハ
 蘭根ノ如ク鬚根ハ纖細ニメ鬚端ニ珠根ヲ生ス。啓蒙種
 類ヲ列舉スル一頗ル詳ナリ。故ニ略之。附一全花
 ニ實礎并兩蓋共郭大圖

コンハルリア

ヤボニカ

Conallaria japonica

春氏

スラテリア

ヤブラン

Platanus

radicans

西勃氏



(43)



TSURUBO; SANDAIGASA.
BARNARDIA JAPONICA ROEM. ET SCH.
(LILIACEAE.)

〔四三〕 ツルホ

サンダイガサ

綿糸児

〔百合科〕

田野普ク生シ。根葉共ニ山慈姑ニ似。初秋中心莖ヲ抽ク「尺餘。梢ニ有梗花ヲ以テ穂状ヲナス「三四寸。花長匙状ノ六瓣色淡紅紫。實礎楕圓ニノ三道アリテ白色。二柱併接為一。雄蕊六淡紅紫色。葯亦同色ニノ黄粉ヲ吐ク。一種花白色ニノ黄葯ノモノアリ。葉形同ノ只花莖稍長。穂亦長ノ六七寸」 附全花郭大圖

ラルニトガルユム

ヤポニクユム

春氏

ornithogalum

isopanicum

ラルニトガルユム

ナルボ子シ

羅

ナルボ

按林氏ノ第五種ニ挙ル

ornithogalum narborum

子シス

ホーゲルメルク

蘭ハ。即鐸氏ノ

rugck

dogmull

ヘルドト

アイユン

フア

ナルボ子シ

ナルモノニノ。本条ノ白花ノ品ニ的當ス



NIRA.
ALLIUM SENESCENS L.
(LILIACEAE.)



（四二）ニラ

韭

〔百合科〕

葉狹長ニノ扁。小葉麥門冬葉ニ似テ滴ノ厚。淡緑帶白色。夏末葉心莖ヲ抽クヲ尺餘。扁ニメ兩側殺銳。頂ニ數十花繖狀ニツキ。形山蒜花ノ如ク。六瓣白色六雄蕊ニメ黄藥長サ瓣ト齊ク。莖ノ本扁大ナルヲ山蒜ニ於ルガ如ク甚シカラズ。子室柱狀ニアツテハ山蒜ニ於ルト同シ。實熟メ自ラ開キ内ニ小黑子アリ。稚草ノ根ハ瘦薄鱗ノ聚結塊。老草ノ根ハ結束殆ト木様ヲナシ。大サ小指ノ如ク形知母根ノ如ク。一側ニ多クノ白鬚根ヲ出ス。ソノ狀他ノ葱蒜ノ類ト大ニ不同。附兩莖子室郭

大圖

第二十五種

アルリウム

セリスコンス

allium

seriscon

羅

フルラウデニデ

florulaudeni

ローク

lock

蘭

按林氏花色暗紫ト云本邦ノ白色ナルト不同

(41) SUTGOBIRU.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)



〔四一〕ステゴビル

〔百合科〕

葉^{ノビル}山蒜ノ如クナレ^レ氏更ニ細小。長サ尺餘。夏晚葉枯^レ。初秋ニ至テ花莖ヲ出ス^ヲ尺餘。條稜^{アツテ}殆ト方。梢頂ニ一寸餘ノ五稜ヲ出シ。每頭一花。形蒜花ノ如クナレ^レ氏瓣狭ノ尖銳。色亦相似テ淡紅紫暈アリ。子室扁圓三道アル^ヲ非類ノ常態ニ^ノ。一柱頭僅ニ三裂シ。六雄蕊黃葯。莖本扁ナレ^レ氏韭ノ如ク一連ナラズ。各々別ニ子室ニツキ瓣爪ニ接ス。且蒜蓋ノ如ク長カラズ。柱頭共ニ瓣尖下ニアリ。花後尋テ葉ヲ出シ冬ヲ凌テ不枯。面平扁背膨隆條稜アリ。臭氣蒜ノ如ク。根亦同ノ小。按ニ此種山蒜ノ一種ナレ^レ氏。花梗ノ間ニ珠根ヲ生ズル^ヲナク。又葉花時ヲ不同ノ殊異アリ。雀巢菴之ヲ東濃ノ山ニ得。榕室氏ハ之ヲ江北ノ地ニ得ト云。各地ニナ無名。ステゴビル。ハ余ガ新訂ニ出。附一瓣並兩蕊子室郭大圖

卷之六 蜀一



(四十)ノビル

山蒜

〔百合科〕

葉狭長筧様半規状ニノ稜條アリ。色淺緑帶白。仲夏莖ヲ抽ク一ニ尺。數葉ヲ互生シ。頂ニ有梗花ヲ以テ繖ヲナス。披針狀六瓣白色。尖微紫且紫色ノ筋條アリ。梗下薄膜様ノ惣苞アリ。子室三箇一併各縱道アリ。中心一柱。雄蕊六ニノ藥紫色。蕊莖ノ本扁大ニメ各蕊相連リ。以テ蜜槽ヲナス。又莖頭花ナク。尖頭ノ珠塊ヲ簇生シテ圓球ヲナシ。又珠塊ノ間ニ花ヲ交ユルアリ。フノ初ノ花アルモノハ。漸ニ梗間ニ珠ヲ出シ。又珠塊球ヲナスモノモ。已ニメ花ヲ交ヘ開キ。遂ニ花球必ス相併スニ至ル。蓋シ此珠ハ。零餘子ト其趣ヲ同フシ。地ニ落テ苗ヲ生シ。又直ニ莖上ニ萌芽スルアリ。根ハ圓塊薤ノ如メ小

第二十二種

アルリウム

ツレラセウム

ムスコロイダヘ

ローク

allium

obscurem

羅

mostruig

loft

薤

(39)



TAMAMURASAKI.
WHITE FLOWER.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)

（冊九）タマムラサキ

一種白花者

〔百合科〕

草狀前種ト略同フメ。葉脚鞘様互生シ上ル。前種ヨリハ稍低ク。秋殆ト圓キ一莖ヲ出ス。前種ヨリハ高メ二尺許。頂ニ花繖ヲナス。花數前種ヨリハ少ク。ソノ瓣莖子室ノ形ハ同メ白色ニメ黃葯。葉ハ前種ヨリ狭メ細ク。高直ナレバ花下ニ終リ。色深緑ニメ黄ズイセンノ葉ノ如ク。形薔葉ト同シク。五稜アツテ鈍三角。

(38)



TAMAMURASAKI.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)

〔冊八〕タマムラサキ

〔百合科〕

脚鞘様ナル葉ヲ互生シ上ルヲ六七寸。葉心殆ト圓キ一茎ヲ抽ク一尺餘。頂有梗多
花ヲ繖狀ニ著ク。形色薤ト全ク同ク。實亦同シ。只花數を多ノ球様ヲナス。葉ハ薤
ヨリ太フノ長ク。頗ル直立シテ二三葉ハ花上ニ出。形正三角ニ淡綠色。根亦薤ノ
如ク三四塊相聚テ圓長ニノ扁。臭氣^{ニミヤク}繖ノ如ク甚シカラズ。此種并次糸ノ種共ニ薤
ノ一種ナルガ如クナレ氏。全体一殊態アリ。且至冬苗枯レ。薤ノ雪下猶蒼翠ナル
ト同ジカラズ。

種名未詳

(37)



YAMA-RAKKYŌ.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)

〔冊七〕 ヤマラツキヤウ

〔百合科〕

所在山崖溪邊下湿ノ地ニ尤ヨク自生ス。薤ノ一種ニノ葉至テ細ク。三稜ニノ殆ト半規形。高一尺許深綠色ニメ光澤アリ。脚ニ微紫色ヲ帶ブ。外葉ノ鞘様ヲナスヲ稍高ク。薤薹ノ僅ニ地上ニ出ト不同。秋花莖ヲ抽ク。略葉ト齊ク。圓細ニノ剛ク。花繖ノ狀薤ト同ノ稍小。花數亦多カラズメ。梗垂下ノ色深紫。根形亦薤根ト同ノ小。

按林氏第三十六種

アルリウム テノイスセムム
allium tenuissimum.

アルレルハイニステ ローク
allotopis to look.

ノ形狀本条ニ合ス。但林氏ノ所說根色帶紫花色淡紫ト云フニ些慊ナキヲ不能。假令正當ナラザルモ。ゾノ一種タルニ論ナシ



RAKKYŌ.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)

（卅六）ラツキヤウ


薤

（百合科）

葉狹細長サ一二尺。面平背圓。兩側僅ニ角アツテ。五稜ニノ鈍三角。經冬不枯。秋新
苗葉ノ外側ヨリ圓莖ヲ出シ。球狀ヲナシテ花アリ。花數不多シテ點頭下垂ス。花六
瓣紫色。子室三稜三區ニノ一柱。雄蕊六ニノ對。根山慈^{ノビル}根ニ似テ大ニ。旁ニ子根
ヲ生シ繁殖ス。ソノ根ヲ以テ醋醬ニ漬テ食料トス。

種名未詳

(35) Ō-ASATSUKI.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)




〔卅五〕オホアサツキ

〔百合科〕

近來江戸ヨリ來ル。余未タ其產地ヲ詳ニヒス。或云米利堅種ナリト。形冬葱ワケギト同フ
ノ稍大ニ。葉色深緑ニソ縦ニ線條滿布シ。他ノ葱類ノ滑ナルト大ニ同シカラス。根
際根塊暗紫紅色ヲ帶ビ又初夏アサツキト同ク。花色亦アサツキノ花
ト一般ナレバ其一種大葉品ニカ、ル。花後葉衰ヘ冬ニ至テ盛ナレ氏。葉ヲ食フ
ニ剛フシテ佳ナラズ根味アサツキト同シ

(34)



ASATSUKI.

ALLIUM SCHOENOPRASUM L.

(LILIACEAE.)

〔卅四〕アサツキ

絲 葱

〔百合科〕

北地高山又吾北山ニモ自生ス。葉ハ葱ノ如ク圓ク。細キ「燈心草」ノ如ク空洞。尺許。色淡黄緑。夏初花茎ヲ抽ク。亦同形ニモ高サ葉ノ如ク。苞ニ裂ノ淡藤花色ノ多花ヲ簇生ス。形冬葱^{ワケギ}ノ花球ノ如ク。花稍大ニモ瓣尖銳。子室兩齒亦同シケレ^氏。雄齒短メ。瓣内ニアリ。葯淡紫色。根ハ薤^{ラギヤ}ノ如メ小。表皮紅紫。此品葉形葱ノ如ク。根形薤ト同ク。花後葉衰ヘ葱蒜ノ凌冬が如クナラズ。山人葉ヲ食ヒ。又根ヲ採テ食フ。薤ノ如シ

第三十五種

アルリウム

セノプラスム

allium

schoenoprasum

羅

ビースローク

bisloak

蘭


(33)

卷八

六圖一

三十四

平水全載



WAKEGL.
ALLIUM AESEALONICUM L.
(LILIACEAE.)

（卅三）ワケギ

冬葱

〔百合科〕

葱子ギト同形ニノ草細小。臭氣亦少シ。八月根ヲ分テ栽ユ。二三月ニ至テ充繁茂シ可食。初夏ニ至テ漸ク衰フ。時ニ根ヲ堀リ簷下ニ掛ケヲキ。八月下地スルヲ佳トス。若不爾メ常ニ地中ニアレハ。反テ繁殖セズ。此品多クハ不結實シテ根ヨク繁殖シ。分之栽ユ。故ニワケギノ名アリ。稀ニ三四月ニ莖ヲ抽キ。伸テ葉上ニ至リ花ヲツク。苞三裂形略アサツキノ花ノ如ノ稍小。瓣短ノ白色。瓣心緑條アリ。子室扁圓三縱道アツテ一柱。雄蕊六莖。葯淡黄微綠色ニノ瓣上ニ出ル。

附 一子室并柱 二雄蕊 三花瓣共郭大圖

按「ユイン」ノ一種ナレ氏西書中未見載此種

(32)

YAGURA-NEGI.
ALLIUM.
(LILIACEAE.)



〔卅二〕 ヤグラ子ギ


樓子葱

〔百合科〕

葉常種ノ葱ト同フメ。夏月當中ノ葉梢一葉ヲ分チ。ソノ腋ヨリ數根ノ嫩苗并數花ヲ生シ。一心葉上テ更ニ又葉ヲ分チ。苗花ヲ生シテ層ヲナシ。多キモノハ四五層ニ及ブ。故ニヤグラノ名アリ。蓋シツノ苗花並セ生スルノ態ハ蒜（ニシ）又ハ山蒜（ニシ）ニ於ルト一般トス

西書中未得此種名

(31) ŌNEBUKA.
 ALLIUM FISTULOSUM L. VAR.
 (LILIACEAE.)



(冊二)


オホ子ブカ

〔百合科〕

余未タ此種ノ產地ヲ詳ニセズ。甲
 州常州ノ邊多ク栽培根ヲ諸州
 輸ス。煮食フニ柔滑ニメ味厚シ草形
 常種ノ葱ニ同フメ惣テ大ニ。根多ク
 簇生セズ。根粗大トレ。珠塊更ニ大ナル
 ヲ加ヘズ。莖ハ高ク葉上ニ出三尺許ニ
 及ブ。生殖諸部ノ形亦常種ト同フ
 ノ大ニ。花球ノ大サ。殆ト拳頭ノ如シ

按林氏第三十一種

ノ下所說形狀種々一ナラザレ氏。概ルニ莖ハ長
 大葉ヨリハ高ク。又根側子珠ヲ多ク生セザルハ
 ミナ一般ナル如シ。今本条ヲ見レニ。ソノ態一樣
 ナレバ。之ヲソノ種中ニ可收モノ、如シ。猶他日
 参考ノ書ヲ得テ將ニ決セントス



(30)



NEGI; NEBUKA.
ALLIUM FISTULOSUM L.
(LILIACEAE.)

(三十) 子ギ

子ブカ

葱

(百合科)

形状衆所通知。啓蒙亦載之。產地培養ニヨツテ大小長短不一レ也。概ルニ莖葉共ニ圓長空洞。花莖高ク葉上ニ出ツ。長梗ノ多花ヲ以テ圓球ヲナシ。薄苞之ヲ被ヒ。花軀鐘様ニメ三稜。六瓣半披針狀ニメ尖銳白色。内ノ三瓣ハ差ヤ長ク纒ニ哆テ展開ニ至ズ。子室圓ノ三起アツテ一柱不長。雄蕊六莖長ク瓣外ニ出。葯黃色。一種夏葱一名漢葱云アリ。形状本条ニ同フメ小。花實ノ形亦全同シ。此種ハ夏時盛ニ芽ヲ出シ分チ採テ愈繁茂ス。故ニ夏中ノ用ニ佳トス。形状只小ニメ異ナシ。故ニ圖ヲ別ニセズ。功用藥鏡大蒜下ニ詳説アリ。

附 一 全花

二 實礎兩蕊共郭大圖

第三十四種

アルリウム

ヒストユロスム

allium

pistatolum


羅

glau

アユイン

蘭

(29) NINNIKU.
 ALLIUM SATIVUM L.
 (LILIACEAE.)



〔廿九〕 ニンニク

葫

〔百合科〕

草狀根形啓蒙説之。衆亦通知。故ニ略之。大小二種アリ。下圖即大者 小者ハ幹上珠根ヲ生

ル一層。大者ハ數層ニ及ビ。ツルクビノ別稱アリ。共ニ珠根ノ間ニ數花ヲ出ス。梗

一寸許花六瓣。外位ノ三八狭ク。内位ノ三八濶等。大低似類ノ常套ニメ。色白質紫

暈アリ。實礎鈍三稜ニメ一柱。雄蕊六莖約黃色。ツノ外瓣ニツク三莖ハ狭ク。内瓣

ニツク三莖ハ濶メ五裂シタビ中位ノ一裂上ニ約アリ。ツノ形他種ト大ニ不同。蓋

シ此種性幹上珠根ヲ生シ以テ生殖スル故ニ。花實ノ用不重。是以花常ニ少ク。且熟

實ニ及者愈少。又ツノ花瓣ノ數ニ不同アリ。又實礎ノ側ニモ珠根ヲ生ルアリ。主

功詳藥鏡 附一全花 二雄蕊二種 三實礎并柱共耶大圖

第十種

アルリウム

allium

アルリウム

allium

サチリウム

salium

スコロトプラスム

scorotasyum

コノフローク

konofloek

ノールドセローク

noordsehoek

大者

小者

(28) GYŌJA-NINNIKU.
ALLIUM VICTORIALIS L.
(LILIACEAE.)



卷之二十一
二
二

(廿八) ギヤウジヤニンニク

荖葱

〔百合科〕

春宿根苗ヲ生ス。葉略紫萼葉ノ如ク。産地ニヨツテ狭濶不同。今コ、ニ所圖ハ。伊吹産

シノ葉ノ如シ大抵二葉ニメ花茎ヲ出ス高一尺餘。葉柄互ニ抱テ茎ヲ包ム。茎葉共ニ帶白

綠色。柄ニ暗紫色ノ細點ヲ滿布ス。莖頭一繖花ヲツク。薄苞アツテ萼ナク。花五瓣披

針狀ニメ白色。白山産ハ、ソノ未放ヤ。帶紫色。正。開ニ至レバ、紫色僅ニ梗ニ残ル。子室圓扁未ニ頭ニ分レ淡黄色。一柱

白色ニメ尖リ。腹面ニ黄色ノ一隆起アリテ。子室微ク傾ク。雄蕊六長ク瓣外ニ延ビ

葯黄綠色。花葉根共ニ韭臭アリ。根ハ薤ノ如クノ長ク。老褐色ノ膜アツテ破之。生根

ヲ外傳シテ下体ノ痒急ヲ治ス。娠婦ニ在テ尤功アリ。乾ケハ臭味共ニ消ス。

附一雌蕊背面 二腹面共郭大圖 三全花一倍圖

第五種

アルリウム

ヒクトリアリス

ゲウラツクテ

ローク

allium

dictamnalis . 羅

gustatit

look . 蘭

ブルグ

ローク

鐸氏

burg look

(27)



〔廿七〕クロギバウシ


〔百合科〕

葉トクダマヨリハ狭ノ尖リ、質剛厚ニタ内ニカ、ヘテ直立シ。ソノ色深緑帶黒ナルヲ以テクロギボノ名アリ。夏秋ノ際花アリ。葉ニ比スレハ形大ナラズ。白色ニメ淡紫暈アリ。又色質同フメ小葉ナル一種アリ



KURO-GIBŌSHI.
FUNKIA SIEBOLDIANA HOOK.
(LILIACEAE.)


(26) TOKUDAMA.
FUNKIA.
(LILIACEAE)



〔廿六〕 トクダマ


〔百合科〕

形トウギボノ如ノ高一尺許。葉厚ノ面背共ニ白粉ヲ帶ガ如ク。四五月花アリ。色尤白シ。又此一種ニ葉面凹凸アツテ恰モエボシタ、キヲ見ルガ如キモノアリ。木曾ニテエボシウルイト云。ウルイハギボウシノ邦言ナリ。




(25) TAMA-NO-KANZASHI.
FUNKIA GRANDIFLORA SIEB.
(LILIACEAE.)

〔廿五〕タマノカンザシ 玉簪一種
形状啓蒙ニ詳故略之 〔百合科〕









并四タウギバウシ 玉簪
 〔百合科〕
 形状啓蒙ニ詳故略之

TŌ-GIBŌSHI.
 FUNKIA SUBCORDATA SPRENG.
 (LILIACEAE)

(23)



MIDZU-GIBŌSHI, SAJI-GIBŌSHI.
FUNKIA.
(LILIACEAE.)

水
六
岡
一
目

三
十
四

平
木
全
載

〔廿三〕ミヅギバウシ

又サジギバウシ

〔百合科〕

好テ湿処ノ地ニ生ズ。葉狭長他種ト不同。秋花ヲ開白質ニメ紫暈紫條アリ。又一種白花ナルアリ。或云廣群芳譜ノ所謂小紫小白ナルモノニ充ル

(22) IWA-GIBŌSHI.
FUNKIA.
(LILIACEAE.)



(廿二) イハギバウシ

〔百合科〕

山中礫地ニ生シ葉短小色淡黄綠色。花亦小ニメ半開。白色紫暈アリ。

(21) KOBAGIBŌSHI.
FUNKIA OVATA SPR.
FORMA LANCIFOLIA
(LILIACEAE.)




卷之六
(一) 終一
〔廿一〕コバギバウシ

七八月花アリ帯紫色高一尺餘

〔百合科〕

(20)



ŌBA-GIBŌSHI
FUNKIA OVATA SPR.
FORMA. UNDULATA
(LILIACEAE.)

家
六
圖
一
目
三
十
三
水
全
載

(三十) オホバギバウシ

深山ニ生シ高二尺餘花白色淡紅暈ヲ帶ブ四月開花

〔百合科〕

(19)

GIBO; GIBŌSHI.
FUNKIA OVATA SPRENG.
(LILIACEAE.)

卷之六

六綱一目

二十

平泳在載



(十九)ギボ

ギバウシ

白萼

紫萼

〔百合科〕

原野山足深山等处ニ自生シ。人家亦多栽ユ。ソノ地ニヨツテ大小種々アレ根葉
ミナ筧様ノ長柄アリ。葉ハ卵圓ニノ尖リ。葉間莖ヲ抽キ穂ヲナシ向側花ヲ綴リ。毎
花鱗様ノ小葉アツテ護之。花本細筒ニメ短梗アリ。漸豊大六裂披針狀。或ハ半開或
ハ正開シ。實礎軸圓六縱道アリ。一柱長ノ結頭繖外ニ出。六雄莖柱ヨリ短ノ黃藥。草
小者。莖一尺餘。大者二尺餘。トウギボ。タマノカンザシ等ニアツテハ。五六尺ニ及ブ。
葉ニ廣狹。又面ニ凸凹不齊。
本曾産エボシウルイト云
ウルイハギボノ方言也ナルアリ。色ニ淡綠。濃綠。クロギ
ボ
帶白。又間道種々ナルアリ。花大低白色。白萼或ハ帶紫。紫萼ソノ紫色ニ淡アリ。濃アリ。又
花候ニ早晩。テル等不暇毎舉。今僅ニ數種ヲ舉ク。附兩莖實礎本分圖。按西書中
未タ本条種ヲ列举スルヲ見ズ。春氏 *hemuscallis japonica* ハメロカルリス ヤポニカノ名ヲ製ノギボノ譯ヲ下
セドモ。的指スル処何如ヲ不詳。名疏西勃氏ノ説ニツイテ。三名ヲ奉。姑掲之俟後識
者

hemuscallis
ハメロカルリス

japonica
ヤポニカ

hemuscallis
ハメロカルリス

undulata
ユンドユラタ

hemuscallis
ハメロカルリス

corbata
コレバタ

イワギバウシ

紫萼一種

春氏

シヤギバウシ


間道玉簪

西勃氏


トウギバウシ

玉簪

春氏



(十八) ユウスゲ ヨシノキスゲ 麝香萱
 葉クワシザウヨリ小ヒメクワシザウヨリ
 大。五六月莖ヲ抽ク。高三尺ニ超ヘ
 テ瘦細。梢頭分叉亦長クノ。ヒメク
 ワシザウトワノ趣ヲ異ニシ。花亦微
 大色尤淡ノ微香アリ。此花日暮テ
 初テ開キ。日昇テ衰ヘ。午前二週ム。
 故ニユウスゲ。又マツヨヒグサノ
 名アリ



YŪSUGE; YOSHINO-KISUGE.
HEMEROCALLIS DUMORTIERI MORR.
(LILIACEAE.)

(17)



ZENTEIKWA
HEMEROCALLIS LONGITUBA MIQ.
(LILIACEAE)

卷之六
六
十八
三



(十七) ゼンテイクワ
 セツテイクワ 日光キスゲ 金萱
 草常種ノクワンサウヨリ小。ギスゲヨリ大。初夏
 花ヲ放ク亦キスゲヨリ大。メ色金黃

(16)



BENIK WANZŌ.
HEMEROCALLIS GRAMINEA ANDR.
(LILIACEAE.)

（十六）ベニクワンザウ

紅萱

〔百合科〕

夏ユウスゲト同時ニ花アリ。ヒメクワンザウノ如クシテ。花色黃褐暗赤。葉ヒメクワンザウヨリ狭ノ長シ。此種東濃金山ノ邊ニ自生ス。

(15)



HIMEKWANZŌ.
HEMEROCALLIS.
(LILIACEAE.)

(十五) ヒメクワンザウ

金萱

〔百合科〕

金生山夜叉嶽等ニ多ク自生シ。人家亦栽之。常種ヨリハ小ニメ葉狭小一二尺。三四月花アリ。亦小ニメ金黃色

ヘメロカルリス

hemerocallis

リ、ヲ

lilio.

アスホデルユス

asphodelus

フルユアス

fulva

印葉圖

リ、ヲ

アスホデルユス

lilio

asphodelus

ルユテユス

luteus

物印満



(十四)

ヤブクワンゾウ オニクワンゾウ 千葉萱草 (百合科)

近道野生ノ緩草ニテ。草狀園生ノ品ト同ジケレド。花重
弁ニメ色暗紅ヲ帶ビ紫黒點アリテ美ナラス。且園生ノ
品ヨリハ花稍晚レテ放ク。花心一柱アリ頭十許ノ雄蕊
ニ分レ。又柱ヲ囲ンテ長大雌蕊四五莖アリテ實礎ヲ
具セズ。按此種本邦原野普ク自生シ。前条種ノ自生西
洋亦此種アルヲ説ケバ。前条種ノ変生ニアラ
ズ。別ニ一種ニメ其實礎ヲ具セズメ繁殖ナルヲ一般
ナルニ在テハ。全未タ其故ヲ明ニスルヲ缺。姑俟後
考之日

第二種

ヘメロカルリス

フユルファ

hemerocallis fulva

羅

オーデ

ダフスコーン

トコ

lagotis

蘭

YABUKWANZŌ; ONIKWANZŌ.
HEMEROCALLIS.
(LILIACEAE.)



WASURE-GUSA.
HEMEROCALLIS FULVA L. FLOW. DUPL.
(LILIACEAE)

近道野生ナク伊吹山ニ
多ク自生アリ。人家亦多
ク殖テ草状衆ヨク通知ス。
故ニ畧之。此類ニ花本細ク
筒様ニ聚リ。未六弁。ソ外者狭小
内ハ濶大。各ハ一雄莖ヲ出シ。實礎ニ
稜ニメ尖リ。一柱長ク雄莖ノ未ニ出。
韃且人ハ此葉ヲ取り乾シ揉ミ纖維
ヲトリ織テ布ヲ製スト云
第一種
ヘメロカリス
フラフア
hemerocallis flava 羅
デーレ デフスコー
foete dyglion 蘭
按本邦萱草ノ種類ニ草太
花色ノ紅黃花候ノ早晚。等ニ異
アツテ頗ル多シ。今ソノ品ヲ畧載
ス。林氏只此条及次条ノ二種ヲ
挙グ。物印滿并ニ印葉國等ニ
金萱ノ一種アルノミニ他種アル
ヲ不説

（十三）ワスレダサ

萱 草〔百合科〕



(12)



ŌBA-YUKIZASA.
SMILACINA JAPONICA. A. GRAY.
(SMILACEAE.)

十二 オホバユキザ、

〔土茯苓科〕

北地溪山吾能郷山亦アリ。形小葉品ト同フノ惣テ大ニ。高サ三尺ニ過ルニ至ル。生
殖部魚異 附 全花郭大圖

西名載前条下

- (11) YUKIZASA.
SMILACINA JAPONICA A GRAY. VAR. MINOR.
(SMILACACEAE.)



（十一）ユキザ、

鹿 藥

〔土茯苓科〕

啓蒙所記形狀可見春末初夏ノ際。莖梢分叉穗狀ヲナシ花ヲ綴ル。無萼ニメ披斜狀六瓣白色。實礎柯子狀三道アツテ鈍三起ヲナシ。頸延テ柱ヲナシ頭三裂。雄蕊六二ノ黃葯 附 全花郭大圖

第六種

コンハラリア

ステルラタ

羅

ゲステルンデ

ダルコロイド

蘭

Convolvulus pilulatus.

Gentiana peltata.

按林氏形狀ヲ説ク「粗ナレ氏。印葉圖所載。大葉ノユキザ、ナル」分明ナリ。可併見。

(10) CHIGO-YURI.
DISPORUM SMILACINUM A. GRAY.
(MELANTHACEAE)



(十) チゴユリ

〔藜蘆科〕

高尺許。草形惣テホウチヤクサウニ似。就中ソノ一種大ナル品ニ於テハ。殆ト分別シガタキニイタル。四月ニ莖頂ニ花ヲ放ク。尖披針狀ノ六瓣。白色淡黄緑ヲ帶ヒ。無萼ニメ梗ヲ以テ下垂ス。實礎圓ノ一柱。三裂殆如三柱頭少ク反シ。雄蕊六ニメ。葯黄色。後黑色ノ圓子ヲ下垂ス。一種オホチゴユリト称スルアリ。莖葉稍大ニメ。高二尺許ニ及ビ枝ヲ分ツト却テ多カラス。葉ニ光リアリテ葉間紫黑色ヲ帶ビ。花形同フシテ微大。

按「ユフラリア」ノ屬ニ可收乎。西書中未此種ヲ見ズ。

(9) TŌCHIKU-RAN; KAGURAZASA.
DISPORUM PULLUM SALIS.
(MELANTHACEAE.)



（九）タウチクラン

又カゲラザ、

萬壽竹

〔藜蘆科〕

百品考形状ヲ詳説ス。五月花アリ形ホウチヤクサウノ花ノ如メ小淡黄綠色ニ
メ帶紫色。實礎柯子状ニノ三稜。一柱半裂三叉。雄蕊六ニメ黄葯。亦ホウチヤクサウ
ニ同フメタゞ實礎ノ状異アルノミ

按前条ノ一種

(8)



HŌCHAKUSŌ.
DISPORUM SESSILE DON.
(MELANTHACEAE.)

(八) ハウチヤクサウ

萬壽竹一種

〔藜蘆科〕

山中陰地ニ生ス。高一尺餘。葉橢圓ニメ尖。條脉分明。本少ク莖ヲ抱テ互生スル。大葉ノチゴユリニ甚タ相似テ殆ト分別シ難シ。稍柔。腋枝ヲ分チ。枝又垂ヲ出シ。或ハ花ヲ出ス。梗長一寸許。二三或ハ五六ニ分レテ下垂ス。瓣爪狹長背隆起シ。色淡白未濶ノ尖淡綠暈アリ。六瓣齊シク並ヒ恰モ筒様ノ如ク。尖纔ニ披反スルノ形寶鐸ノ如シ。故ニ訛轉ノハウチヤクサウノ名アリ。實礎圓長。一柱半裂三トナリ。六雄蕊ニノ黃葯。後實ヲ結フ圓ノ櫻子ニ似テ稍大ニ。熟ノ黑色

第三種

ユフリア

セツシリホリア

ランゲステールデ

ルコロイド

Aspidistra

fragilis

羅

angustata

delavayi

蘭

按ホウチヤクサウ。カグラザ、共ニ同一種ナレ氏林氏ニ卵圓披針狀ノ文アレバ。本条次条孰レヲカ正當トセン

(7) HIME-IDZUI.
POLYGONATUM JAPONICUM MORR. ET DEC.
(SMILACEAE.)



（七）ヒメイズイ

〔土茯苓科〕

深山ニ生シ茎直上五七寸。全形姜蕤ノ如メ小。葉橢圓ニシテ每葉腋一花ヲ開ク。蓋形姜蕤ニ同メ亦小。根白色線様ニメ長ク蔓延シ。処々ニ多ク苗ヲ分ツ。姜蕤黃精ノ根狀ト同ジカラズ。又木曾菰曾ニ生ズルミヤマイヅイト稱スルモノハ。茎高一尺許。葉狹長ニメ上ニ向ヒ。根ハ本条ト同様ナレバ亦此種類ニカ、ル

按コシヲラリアノ属ナレドモ西書中此種ヲ載ルヲ未見

(6) ŌBA-ŌSEI.
POLYGONATUM

(SMILACEAE.)




(六) オホバワウセイ

白及黃精

〔土茯苓科〕

啓蒙ニ出ス処ノ苗高四五尺。フノ根節々圓扁。大サ一寸餘。横ニ連生ノ白及根ノ形ノ如云々者ユレナリ」

(5)



NARUKO-YURI.
POLYGONATUM THUNBERGII
MORR. ET DEC.
(SMILACEAE.)

（五）ナルコユリ

黄精

〔土茯苓科〕

草形萎蕤ニ大同小異。茎圓ク葉大抵狭長ニシテ共ニ光澤アリ。根萎蕤ニ比スレバ。粗短ニメ結節アリ。花梗三四岐ヲナス等。ソノ殊標トス。花形萎蕤ト同シク。實亦同シ。山中陰地ニ生シ。大小種々アリ。大者高四五尺小者僅ニ一尺餘。本条所圖ハソノ中者ニメ所謂玉竹黄精ナルモノ。漢種ノ品亦相似テ間ニ葉正對スルヲ交ユルノ異アリ。大者ハ次条所載。又圓葉ノモノ。又葉心暗紫色ヲ帶ビ或ハ紫緑條道ヲナスモノ等ハ。ソノ小葉ナルモノニカ、ル。其種毎舉ニ暇アラズ

第四種

コンファラリア

ムルチフロラ

ヘーデルミフ

ダルコロイド

Conchallaria multiflora

羅

Deltoleum saltensis

蘭

(4)



IBUKI-WANIGUCHI.
POLYGONATUM.
(SMILACEAE.)

卷之六
(一) 伊吹山ニ産ス。高一尺餘。莖條稜微ナレ氏。草形根狀ニヨレバ。萎蕤ノ一種
(四) イブキロニグチ 江州伊吹山産

〔土茯苓科〕

伊吹山ニ産ス。高一尺餘。莖條稜微ナレ氏。草形根狀ニヨレバ。萎蕤ノ一種
ニメ。葉稍濶短。每葉腋一細梗ヲ出シ。尖蛋形ノ四苞葉ヲ以テ。二三或ハ四花
ヲ色テ下垂ス。花形ワニグチサウト同様ニメ。只ソノ苞小ニメ多ク。花
數亦多キノミ

按亦未詳其種名

(3) WANIGUCHISŌ.
POLYGONATUM.
(SMILACEAE.)



（三）ワニグチサウ

姜蕤一種

〔土茯苓科〕

草狀姜蕤ノ如クメ小。高七八寸。卵形葉ヲ互生シ。葉間五六分ノ梗ヲ出シ。
似類ノ品ミナ花梗葉腋ニ出特リ此種ハ然ラズ頭ニ二小葉ヲ對生シ。殆ト苞萼ノ如ク。中間ニ二花ヲ
並置ス。花形姜蕤ト同シク。色淡黃綠。ソノ苞葉中二花ヲ並フルノ狀佛閣ニ
懸ルワニグチノ形ノ如シ。莖形亦姜蕤ト同シ。此類大小二種アリ今所圖ハ
小者ニメ其大者ハ葉差圓メ剛シ

按コンファルリア」ノ屬ニメ未詳種名

(2)



AMADOKORO.
POLYGONATUM OFFICINALE
L. VAR. JAPONICUM.
(SMILACEAE.)

(二) アマドコロ

姜蕤

(土表苔科)

姜蕤ト黄精ハモト同属別種ニメ。且各々多種アレバ往々混淆シ易シ。姜蕤ハ。大小アレ氏茎粗ク稜條アツテ多クハ茎ニ暗紫色ヲ帯^ビ。間^ニ青茎ノモノアリ。葉ハ橢圓ニメ長キヲ常トスレ氏。又尤長^ク圓等ノ不同アリ。質厚強ニメ光滑ナラズ。根白色略黄精根ノ如ナレ氏。長ク横行シ結節著明ナラザル等ノ殊標アリ。花黄精ト同シク。稍葉腋ニ毎ニ一梗ヲ出シ或ハ二三岐ヲナシ。黄精ハ三五岐ヲ常トス。毎頭一花ヲ下垂ス。形漏斗様ニメ五裂。尖外^ニ及^ニ白色^ニ尖ニ淡緑暈アリ。實礎^ニ橢圓^ニ一柱結頭白色。六雄^ニ莢筒^ニニツキ。ワノ半ニ至テ離レテ少ク前ニ屈ミ以テ雌^ニ莢ヲ抱擁ス。故ニ花口ヨリ望之ハ車輻ノ轆ルガ如キ状ヲ見ル。西書云。草可咀嚼アリ。實ハ吐劑トナスベク。根甘メ微辛。外用メ顔面ノ皴赤汚点ヲ除ク。又乾末ヲ薔薇水ニ和シ用テ形軀ノ美容ヲ保ツノ良劑ヲナス。然レ氏近世用之者少シ。附實礎兩莖部大圖

第三種

コンファルアリ

ホリコナトユム

サロモンスセーゲル

Camphallaria polygona

羅

Kalamandula

蘭

按林氏每葉腋多ハ一花ト云ヘ氏。卵葉圖ニハ大小二種ヲ挙げ。大者ハ多クハ二花小者ハ多ハ一花。又本邦所産ノモノハ多ハ二三花ナルノ異アリ

(1) KIMIKAKESŌ, SUDZURAN.
CONVALLARIA MAJALIS L.
(SMILACEAE.)



MONOGYNIA

(一) キミカケサウ 又スブラン

米蘭

〔土茯苓科〕

深山ニ生ス。葉一葉^{バラシ}ノ如ニメ小。帶白綠色。二葉或ハ三葉柄ヲ抱テ出。葉側籜内
花莖ヲ出ス。高五六寸。有梗花ヲ下垂シ穗ヲナス。形鐘樣ニメ縁六裂。尖ツテ反
卷。白色無萼。實礎長柯子狀。頸一柱ヲナシ。頭三裂メ外反。亦白色。六雄蕊牀ニ立チ。
短莖黃約。後赤色圓實ヲ結ブ。此花佳香アリ。露水ヲ取頭腦病ニ用テ功アリ。
又花ヲ乾未シテ嚏藥トシ。又葉ニ石灰ヲ和シテ美綠色ノ彩具ヲ成スベシ

第一種

コンファルリア

マヤリス

レリーチース

フアン

デン

ダーレ

Conchallavie mazatlan 羅

Heliotis San Den Gale.

蘭

草木圖說前篇卷六

VL VI.

大垣

飯沼慾齋著述

東京

田中芳男
小野職慾
增訂

草部

第六綱中

久保弘道
橫川政利
同校

HEXANDRIA.

四一 ステゴビル

四三 ツルボ

四五 ジヤノヒゲ

四七 ノシラン

四九 ノギラン

四二 ニラ

四四 ヤブラシ

四六 ケイビラン

四八 シヤウジヤウバカマ

五十 ケマンサウ

十七ゼンテイクハ

十九ギボ

廿一コバギバウシ

廿三ミヅギバウシ

廿五タマノカニサシ

廿七クロギバウシ

廿九ニンク

卅一オホ子ブカ

卅三ワケギ

卅五オホアサツキ

卅七ヤマラツキヤウ

卅九タムラサキ

白花者

十八ユウスゲ

二十オホバギバウシ

廿二イハギバウシ

廿四タウギバウシ

廿六トクダマ

廿八ギヤウヂヤニンク

三十子ギ

卅二ヤグラ子ギ

卅四アサツキ

卅六ラツキヤウ

卅八タムラサキ

四十ノビル

草木圖說前篇卷六目錄

草部

第六綱中

第一目中

一 キミカケサウ

三 ワニグチサウ

五 ナルコユリ

七 ヒメイズ井

九 タウチクラン

十一 ユキザ、

十三 ワスレグサ

十五 ヒメクワンザウ

ニ アマドコロ

四 イブキワニグチ

六 オホバワウセイ

八 ハウチヤクサウ

十 チゴユリ

十二 オホバユキザ、

十四 ヤブクワンザウ

十六 ベニクワンザウ


安政三年原刻

大日本飯沼慾齋翁著

官
新訂
許
艸木圖說

明治七年十二月 美濃大垣

平林莊



飯沼
慾齋
著述

新訂草木圖說

草部

六

VOL. VI

Herpandria 1 @ 50
monogynia.