Herbarium
QK
369
.I36
1874
v.19

UNIVERSITY OF WYOMING
U18100 424 763 8

Herbarium
QK
369
.I36
[redacted]
1874
v. 19

Date Due

Demco 293-5

草木圖說前篇卷之十九

(17) YUKIMOCHISŌ.

(ARACEAE.)

〔天南星科〕

（十七）ユキモチサウ

茎葉ムサシアブミノ如メ。苞ハ天南星ノ花ノ如ク。筒ト共ニ表暗紫細點裏淡黄緑色ニメ亦紫條細點アリ。柱頭圓短ニメ白色故ニユキモチサウノ名ヲ得。雄蕊ノ状天南星ト同ジケレハ雌草亦アルベシ 余未見

説載ムサシアブミノ下

卷之十九

二十

五本草綱



MUSASHIABUMI.
ARISAEMA RINGENS SCHOTT.
(ARACEAE.)

（十六）ムサシアブモ

一茎二大葉ニメ花茎ヲ出ス。一柄三葉一蒂。小葉ノ形圓尖兩側ナルモノ幅尤濶シ。苞巻曲ノ形鐙ノ態アリ。表暗黄緑色ニメ淡紫ノ條アリ。裏帶紫色。柱略天南星ノ如クメ差尽扁。帽頭細メ下漸ク粗クナル。葯暗褐帶紅色。丹後ノ産ニ草微大ニメ花苞共茎尤紫黒色ナルアリ先キニ此種ノ蕊形ヲ見ルニ雌性ナレバ本条ノ雌雄異草ナルコト不待言。附雄蕊本然圖

按此種並ニ下条種ハ。一蒂三葉ノ形ハ。半夏ノ類ト同シケレモ。茎上葉ヲ分チ花ヲ出スノコニ於テハ。前条所挙トソノ趣ヲ同フシテ。ソノ一種タルニ外ナラザルヲ以テ。係テコヽニ収ムルモノ種名未詳

〔天南星科〕



URASHIMASŌ.

ARISAEMA THUNBERGII SCHOTT. VAR.

(ARACEAE.)

虎掌

（十五）ウラシマサウ

一茎、一大葉ニメ花梗ヲ出シ、葉形マヒヅルサウト同フメ差小。花形亦同ジケレ𪜈一茎短クメ葉下ニアツテ彼ノ高ク葉上ニ出ルト不同。苞色黄白ニメ暗紫点アリテ裏面純暗紫。筒ハ淡白色。一種筒本青色ナル𪜈アリ。柱頭細メ長ク曲リ垂ル、丁一二尺マヒヅルサウノ糸ノ長ニ倍ス。是釣糸ノ看アル処也。マヒヅルサウト。此種トハ莖筴ニ線條アツテ蛇斑ナク。根塊ノ側ニ小珠ヲ生シテ苗ヲ簇生スルノ殊標アリ。

〔天南星科〕

(14)
MAIDZURU-TENNANSHŌ.
ARISAEMA THUNBERGII BL.
(ARACEAE.)



（十四）マヒヅルテンナンセウ

一茎一大葉ニメ花ヲ生ス。天南星ノ二大葉ナラザレバ花ヲ不生ト異ナリ。花形草状略天南星ノ同フメ。色淡緑ニメ微々紫暈アルノミ。苞頭細メ長キコウラシマサウノ如クナレ𪜈。彼ノ長キニ不及。此種花梗長メ葉上ニ出頗ル翔鶴ノ態アリ。故ニマヒヅルノ名ヲ得

按天南星ノ一種ニメ種名未詳

〔天南星科〕



卷之十九　二十葉十三

MAMUSHIGUSA; HEBINO-DAIHACHI.
ARISAEMA SERRATUM SCHOTT.
(ARACEAE)

（十三）マムシグサ又ヘビノダイハチ　斑杖

單天南星ト同ク一莖ニ大葉アツテ花莖ヲ出ス。其小葉ノ形亦天南星ト同ジケレ共。只邊緣ニ細居歯アツテ彼ノ平等ナルト不同。又莖鞘ホノ斑色紫褐色ニ交ヘ。尤蛇斑形花色ニ種々アリ。又苞ノ異ニシ装狀等南星ト全ク同シ。此種ハ葉タルヲ以テ標トス。亦雌雄草ヲ異ニス。

又苞ノ尖ノミ暗紫ニメ莖ノ斑尤著明ナルアリ。又苞暗紫ナルアリ。又蝦夷産ハ紅白道アツテ苞色暗紫ナルアリ。又白山ニハ全草小ニメ一大葉ノミニメ苞色光澤ツヨク中心ニ白斑榮。又朝鮮ニハ葉七葉樹（トチノキ）葉ニ似タルアリ。コレヲ北斗サウト云。又葉面ニ雲母ヲ上ミナ葉邊細鋸歯アルノ殊標ヲ具ス

TENNANSHŌ.
ARISAEMA JAPONICUM BL.
(ARACEAE.)



一

二

アルユム
Allium
スペール
Spheer
第
アルユム
Allium

ダラクユルユス
Praecunculus、羅
ウヲルトル
Wortel、鐸氏
二種
ダラコンチユム
Laconteum、羅
パルムブラーヂフ
Palmblad 蘭

フートブラーヂフ
Hutbladig
カルフスフート
Kalfsvet、蘭

按己上二種林氏所説形状些異アレ圧畢竟同種異品ニメ即吾天南星斑杖ノ二種共ニソノ種類ニ外ナラザル如シフノ種名當否ノ仆書ノ参考ヲ得ルノ時ヲ期ス又天南星類ハ羊齒ノ葉状トハ異ニノ雌雄異草タル二十一綱ニ収ムベキモノナレバ林氏ノ之ヲ同族トスルモ詳ヲ缺クニ似レ圧姑フノ例ニ従テ此ニ収ム

（十二）テンナンセウ　諸国。虎掌。由竪。班杖ノ
根大者、莖數尺。小者ハ一
ソノ一者。大ニメ花上ニ出。一者小ニメ花下ニ
五或九ノ小葉ヲ以テ掌状ニ並ブ。ソノ形マムシグサノ葉ノツキ方ト同フシテ。邊
縁平等ニメ彼ノ細鋸刻アルト不同。四月莖梢一花ヲ開ク。全体芋類ノ小者ハ
莖ヲ以テ成ル。本筒様ニ閉テ一片ヲナシ。前ニ折レテ筒ノ上ヲ蓋フ。全莖淡緑ト淡
黄白色トノ縦道アッテ。雌雄異ニシ。雌花ハ莖ニ直ニ一花ヲ開ク。雄花ハ筒ノ如ニメ緑色。頂
等ノ類ハ。ミナ雌雄草ヲ異ニシ。雌雄花共ニ筒ノ如ニメ緑色。頂
邊ニ隠々瘤瘰アリ。雌花ニアッテハ本下ニ扁圓ノ實礎ヲ容布シ。緑色ニメ小点ナク。柱亦紫色ヲ帯ビ
色。後熟メ赤色ノ圓實ヲ容布シ。雄者ハ。白色ノ短梗上ニ暗紫ノ
圓約。三或ハ四五アッテ白粉ヲ吐ク者ヲ満布シ。己ニメ莖ト共ニ萎ス。一種莖ノ
上マムシグサノ如ク。緑白ノ間道ノミニメ紫点ナク。柱亦紫色ヲ帯ビ
莖ニ淡褐色斑アレ共。マムシグサノ如ク著シカラザルモノアリ。此種
畧ホマムシグサノ如ナレ圓　附一雌花莖　二雄花莖共郭大圀

弟一種

天南星。虎掌。由竪。班杖ノ名義。綱目所説種々分明ナラズ。本邦ニ所在亦多シ。一ト
ス。余、姑従師説下其名ヲ天南星ト。

〔天南星科〕



(11)

ZAZENSŌ; DARUMASŌ.
SYMPLOCARPUS FOELIDUS SALISB.
(ARACEAE.)

(十二)ザゼンサウ　ヌダルマサウ　地湧金蓮

溪間陰地ニ生ス。春新葉ト共ニ莖間ニ一花ヲ出ス。一苞側ニ向フテ開キ内ニ捲圓ノ一柱ヲ抱ス。形觀音蓮(ミヅバセウ)ノ花ノ如メ短小色紫黒。柱ハ多細花ノ密迩接簇ニ成リ。滿面只龜甲紋上ニ黄色ノ點綴アルヲ見ル。分之ハ四弁花ニメ。内ニ捲圓短ニノ。觀音蓮(ミヅバセウ)ト其趣ヲ一般ニス。已ニメ葉ヒロガリ形芋葉ノ如ク。一倍圀

根ハ鬚様ニメ塊ヲナサズ　附金花

第十七種

アルユム　ヲファトユム

Arum exhortum

羅　ロンドブラーヂフ　カルフスフート

Ten Blatis Kelfs-voet

蘭

(10)

MIDZU-BASHŌ.

LYSICHITON CAMSCHATCENSE SCHOTT.

(ARACEAE.)

十三

平太生寫

（十）ミヅバセウ　観音蓮

往々山間池沢ニ生ス。葉等葉ニ似テ長二尺ニ超。幅一尺許ニ及ビ。短柄相抱テ叢生ス。一種葉面淡黒点アルモノアリ。共ニ春ニ三月葉未全伸ノ際ニ。葉間ヨリ花ヲ出ス。ソノ形地湧金蓮（ザゼンサウ）ノ徴グ反シ中心一葉如杵長ニ三寸。淡緑色ニメ全体痩瘠花ノ如クニシテ長大一片巴長五七寸。白色ニノ微グ反シ中心一葉如杵長ニ三寸。淡緑色ニメ全体痩瘠花ノ如クニシテ長大一片巴長五七寸。白色ニノ微ク淡黄ノ斑落アリ。分之ハ扁圓ノ四弁内ニ両葉ヲ包ムニ成ル。略白蕾（セウブ）花ヲ出ス。ソノ形地湧金蓮ノ花ノ如クニシテ長大一片巴ナルトハ全ク同ジカラズ。附一全花　ニ花糸並雄蕊　三子室並柱頭共郭大図

雌雄異花　第十五種

ダンブラーヂフ・カルフス・フウート

Lumblubis Calystheit, Rumphii.

羅蘭

按此条並ニ次条ノザゼンサウノ二種ハ。ソノ葉状根形芋類ト異ナレバ。冥々白昔ノ例ニ因リテ。四綱一目ノ下ニ収ムベキモノ、如シ。ソノ葉花ノ状芋類ニ彷彿スルモノ尤疑フベケレバ。姑ク従其例以テ後賢ノ断ヲ俟ツ

KONNIYAKU.
CONOPHOLLUS KONJAK SCHOTT.
(ARACEAE.)

（九）コンニヤクイモ

老根ニアツテハ。四月ノ葉前ニ先ツ莖ヲ抽クコト一尺餘。淺黄緑色ニ淡緑色ノ細点アリテ茶褐色暈ヲ帶フ。根上ニ淡褐色ノ一莖アリ。莖頂紫黒色ノ一苞長五寸許。抱攏筒ノ如ク中心鈍頭ノ一柱アリ。長七八寸。本一寸許ハ。淡黄白色實礎圓ク頸柱様ニメ開哆シ。色紫暈アツテ頂茶褐色。ソノ上邊一寸餘ハ。茶褐ノ細点ナル雌蕊ヲ滿布シ。未端ハ惣テ暗紫色。已ニメ莖側葉ヲ出ス。莖上深缺刻鰐様ノ三五枝ヲ並ヘ。莖上亦多クノ紫黒点アレ氏。斑形略斑杖ノ如ク。一ハ大ニメ竿甩ノ如ク。圓扁ニメ鬚根アリ。採テ褐腐ヲ製ス　附柱本然圖實礎郭大

〔天南星科〕

第一種

ダラコントユム　ポリピルルユム　スペールウヲルトル　フユールブラーヂフ

Dracontium polyphyllum.　羅　*Hubleg spulhotel*

蘭

KUWADZU-IMO.
RICHARDIA AFRICANA KUNTH.
(ARACEAE.)

（八）クハイモ　野芋

暖国ニ自生ス、海芋ノ一種ニメ株幹ヲ成サヾルモノトリ。葉、芋類ト同ク簇生シ。葉間花ヲ生スルコト他種ノ稀ナルガ如クナラズ。老根ニ在テハ、数次連生ス。茎頭一条芋苞ヨリハ、潤短白色朝天。中心一柱亦略同形ニメ短ク下邊ニ雌蕊。上邊ニ雄蕊間ニ黄色細粒満布ス。即雄蕊トス。此種水乾共ニヨク生殖ス　附全蕊一倍

Arum esculentum アルム　エチヲピユム　*Colocasia odorata.* フロン　アルバ　ヲドラト　物印氏

按林氏書中亦載ベケレド余未タ其種ヲ得ズ

〔天南星科〕



(七) マンシュウイモ 海芋

百品考云 暖國ノ産ニメ寒地ニテハ
冬育チガタシ。初ハ芋苗ノ如タ長ズルニ随テ幹ヲ成シ高サ二三尺
ニ及ビ。幹巨クシテ横スチアリ大サ握ニ盈ツ或ハ枝ヲ分チ鳳尾蕉ノ如シ
葉ハ白芋ト同シテ厚ク光アリテ葉背ノ筋高シ。六七月葉心ヨリ花ヲ
出ス大半夏ノ花ノ如クニメ大ニ幅廣メ天南星ノ如ノカ、ヘズ、弁端直立シ
テ下ヘタレズ恰モ仏像ノ船ゴクワウノ如シ。花中ノ裳ニ似テ
長ク巨シテ觀音ノ像ノ如シ。故ニ觀音蓮ノ名アリ。俗ニマンシュウ伝薩
摩ニテハシガシハ伝
按ニ葉形花状芋類ニ外ナラザルヲ以テ收于此レ
其種名ニ於テハ未考

〔天南星科〕



MANSHŪ-IMO.
ALOCASIA MACRORRHIZA
SCHOTT.
(ARACEAE.)

(6)

(六一)

スイモ　白芋〔天南星科〕

説載芋下

HASU-IMO.
LEUCOCASIA GINANTEA SCHOTT.
(ARACEAE.)



卷之十九 三十組十三 三本其永



二些異アルコヲ云。
又ソノ弟七種以下
モホソノ類ナレバ
本邦ノ多種中。的
當ノ品アルベケレ氏。
余未タソノ詳ヲ
不得



IMO; SATO-IMO.
COLOCASIA ANTIQUORUM SCHOTT.
(ARACEAE.)

卷之十九 三十紙十五

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF WYOMING
LARAMIE

巣ノ態アリ。甩根小ニメ圓ク。子ハ條根ノ先ニ生ト同シカラス。故ニホル花アリ。形同シ。余先ニソノ花アルヲ得。一根六莖ヲ併ヘ開ケリ。不知此種ノ常態ナリヤ。下ニツノ圀ヲ載ス。此種根菓共ニ發味絶テ美ナラズ。故ニ專ラ莖ヲ取テ生或ハ煮テ食科トスルニ用ユ。又一種タウノイモ即芋ニ似テ大ニメ莖ニ暗紫色ヲ帶フ。ソノ花ノ形色ハ青芋トメ甩根ヲ食フニ異ナルコトナシ。甩根尤大ニメ子ヲ生ルコトソク。主ヲ煮食フニ亦佳シ。此種ハ濕地ヲ好ム。故ニヨク水ニ堪ユ。又一種ニ一根數科ヲ蓄生スルモノヲヤツガシラト云。即九面芋又ヤマトイモ一名アイサト称スルアリ。根際除微紫色ヲ帶ベドモタウノイモノ如ク紫莖ナラズ。ソノ甩根ハ尤大ニメ皮色ニ紅ミアリ。質硬フメ味美ナル故ニ圃畔側ニアツテ培養ヲ假ラズシテ生殖シ。賤民ソノ子根ヲカキ取テ食フモノアリ。

撿之ニ形狀エグイモニ同シ。盖シ湧水ハ冬猶微温トルニヨツテ冬ヲ凌テ枯レズヨク生殖スルモノニメ。別ニ一種アルモノニアラザル如シ　附

菌　三雌蕊郭大圀　アルニウム　*Arum*

按林氏弟五種　*Arum Colocasia*、羅　コロカシア

アルニウム　*Arum esculentum*、羅　エスクレントゥム

ユーベバール　*Eubeba*　カルスフート　*Calystaut*、蘭等ハ。專ラ食用ノ芋ニメ。各々形狀

(五)イモ又サトイモ　芋ノ類多種。吾郷邊ニ栽テ普ク食用トスルヲ。マイモト云。其種ニ早晩アリ。又子尤モ多ク毋塊大ナラザルモノヲオヤセタゲト云。又ヱグイモアリ。マイモヨリ蔇味多ケレ氏。冬ヲ経テ腐リ易ク。且春ニ至レバ蔇味脱ノ美ナリ。故ニ久蓄ノ為ニ多ク栽ト云。又ヱグイモアリ。秋葉中筆ヲ抽キ花ヲ青ク葉形略同シ。但ヱグイモハ葉色尤モ深緑ナルノ異アリ。秋葉ノ如クノ。大瓣ノ長弁トアリ。一種ハ蔇味差サシ。以上ミナ青芋ニノ筆ヲ開ク。往々ニ筆或ハ三筆ニ分ル。最下ハ緑色ノ各頭花アルヲアリ。形大サ夏ノ花ノ如クノ。大瓣ノ長弁トアリ。一種ハ蔇味差サシ。以上ミナ青芋ニノ筆ヲ直立。漸ク瓣端反下シ。中心一柱長ク立ツヿ七八寸ニノ四段ニ分ル。最下ハ緑色扁圓粒ニノ菌頭アリ。色淡緑白即雌蕊ニノ實礎ッノ中間ニ散布ス。ソノ上段ニ列在スル黄色扁頭ニノ長キハ。蜜菌トス。中段ニアツテ多ク地ヲ占ル者ハ。周邊凹缺刺菊縁ノ如クアツテ上面平ニ微凹シ。色淡黄緑。ソノ菊縁ノ中心毎ニ白色纖蕊アリテ即雄蕊トス。端末一段ハ細ノ尖リ。僅ニ縦紋アツテ粒状ヲナサバルヿ半夏ウラシマサウ等ノ蕊上ノ長鬚ト同シ。惣テ芋類花蕊ノ状大概相同シ。一種タケイモト云アリ。葉形前種ニ同フシテ根結塊多カラス。ソノ子ヲ出スヤ地面ニ横延シ。太サ拇指ノ如ク長七八寸或ハ尺餘ニ至ル。味淡ニノ美ナラザレ氏可食。即偲芋又一種ハ頭尖ラズ。色淡ク肋脈正フノ著ク。恰モ蓮

(4) RIUKIU-HANGE.
COLOCASIA.?
(ARACEAE.)



（四）リウキウハンゲ　葉心臓状ニメ尖リ。本クリコミアッテ芋葉或ハ地湧金蓮ノ葉ノ如ニメ小。ソノ長スルニ至ツテハ。柄五六寸ニ及ビ。簇葉心短花茎ヲ出ス。花本ノ筒様太ソメ短ク。弁大ニメ仰反シ。表淡緑裏暗紅紫色。柱頭長メ上ニ立チ。赤暗紅紫色成實部ノ状似類一般根半夏ト同メ差大

アリサルユム　ネツト　ブレーデブラーデレン
Arisaleum nutans Blubenen. 鐸氏

〔天南星科〕

Ō-HANGE.
PINELLIA TRIPORTITA SCHOTT.
(ARACEAE.)

二十周七回
四
三木生歳

（三）オホハンゲ　〔天南星科〕

山陰溪間ニ生ス。一柄一葉三裂シテヒロガリ殆ト三葉ノ如ク。柄高尺餘脚ニ紫点アリ。數葉間一花茎ヲ出ス。形半夏ト同フシテ大ニ。色淡緑白裏尤モ淡ク。の杜頭細長色ホ淡緑白

按半夏一種大葉者

(2) SHIKA-HANGE.

PINELLIA ANGUSTATA SCHOTT.
(ARACEAE.)



（二）シカハンゲ

半夏ノ細葉ナルモノニメノ三葉一柄。中ナルモノ大ナルモ幅僅ニ二三分ニメノ長五寸ニ余ル。花亦半夏ニ同フメノ小。産処未詳

〔天南星科〕

(1) KARASUBISHAKU.
PINELLIA TUBERIFERA TEN.
(ARACEAE.)

(二)カラスビシヤク　半夏

田野園圃ノ中ニ多ク。春舊根數莖ヲ生シ。莖頭三葉略慈姑(オモダカ)花ノ葉ニ似ク。中ノ一葉大。側ノ二葉稍小ナレ𪜈。長短変態アツテ一ナラズ。夏別ニ一莖ヲ生シ。長ク葉上ニ出。頂ニ長苞アリ縦ニ裂開シ。表緑色裏紫黒色内ニ一條ノ肉アリ。下ニ雌花上ニ雄花ヲツケ。頭長ク莖外ニ立テ尾ノ如シ其状畧芋類ノ花ト一般可併見根ハ土中白鶏ノ未ニアリテ圓ノ白色。新根ハ莖下線根ノ際ニ生ス　主用藥鏡ニ載ス

第四種　チリピルルユム　Arum triphyllum.　羅

チリーブラーヂフ　Triphyllous Arum　蘭

カルフスフート　Calfs foot

桜林氏此種下ニ大小種々アルヿヲ説ケバ下条ノ大半夏亦同種中ニ収ムベキヿ瞭然タリ

〔天南星科〕

平本幸雄

GYNANDRIA.

草木圖說前篇卷十九

草部

第二十綱下

大垣　飯沼慾齋　著述

東京　田中芳男　小野職慤　増訂

久保弘道　横川政利　同校

VOL. XIX.

十七 ユキモチサウ

Iinouma, Yokoussai

草木圖説前篇 卷十九目録

草部

第二十綱下

第七目 多雄蕊

一 カラスビシヤク
三 オホハンゲ
五 イモ
七 マンシウイモ
九 コンニヤクイモ
十一 ザゼンサウ
十三 マムシグサ
十五 ウラシマサウ

二 シヨカハンゲ
四 リウキウハンゲ
六 ハスイモ
八 クワズイモ
十 ミヅバセウ
十二 テンナンセウ
十四 マヒヅルテンナンセウ
十六 ムロサシアブミ

UNIVERSITY OF WYOMING
LARAMIE

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY
OF WYOMING
LARAMIE

飯沼慾齋著述

新訂草木圖說

草部

十九

VOL. XIX.

Gynandria

1 @ 17